


“榮民”

敏速平 注射液 (迪皮質醇)

Methasone Injection “VPP” (Dexamethasone)

本品為一合成之副腎皮質激素，Dexamethasone Sodium Phosphate 之滅菌澄清無色溶液，具糖皮質激素效用(Glucocorticoid Action)，化學結構式：



【成分】

敏速平注射液 4mg/mL

有效成分及含量：每 mL 含

Dexamethasone Sodium Phosphate 相當於

Dexamethasone Phosphate 4 mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Bisulfite、Sodium Citrate、Benzyl Alcohol、Propylene Glycol、EDTA、Water for Injection。

敏速平注射液 5mg/mL

有效成分及含量：每 mL 含

Dexamethasone Sodium Phosphate 相當於

Dexamethasone Phosphate 5 mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Bisulfite、Sodium Citrate Dihydrate、Benzyl Alcohol、Sodium Hydroxide、Propylene Glycol、EDTA(2Na)、Water for Injection。

【藥理作用】

本品注射後迅速產生作用，持續作用時間不長，因此適合作休克之急救和急性副腎皮質機能不全之治療；具消炎作用不但能預防或抑制炎症之紅腫、熱、痛等症狀，亦抑制各種傷害之增殖性(Proliferative)及滲出性(Exudate)反應，對發炎之過程亦有抑制的效果，所以使用後傷口不易發生斑癩(Cicatration)，本品能增加 Angiotensinogen 的形成，Angiotensin 為一相當強的血管收縮成分，同時，本品能使小動脈對缺甲基腎上腺素(Norepinephrine)更具敏感性，使血管收縮，血壓升高，因此適用於休克病人之急救。

內分泌疾患：先天性，或繼發性，或急性之副腎皮質機能不全。

風濕性疾患：創傷後之骨關節炎，骨關節滑膜炎，牛皮癬引起之關節炎，風濕性關節炎，上踝炎，腱鞘炎，急性痛風性關節炎。

膠原性疾患：急性風濕性心臟炎，全身性紅斑狼瘡。

皮膚性疾患：天疱瘡，嚴重得多形紅斑，剝落性皮炎，疹狀皮膚炎，牛皮癬，單狀肉芽腫。

過敏性疾病：支氣管氣喘，接觸性皮炎，過敏性皮炎，血清病，藥物過敏反應，季節性或終年過敏性鼻炎，喉頭浮腫，蕁麻疹。

眼疾患：急性慢性過敏性眼瞼炎，過敏性結膜炎，角膜炎，虹彩炎，眼部帶狀皰疹，虹膜炎，虹膜睫狀體炎，脈絡膜視網膜炎，中心性脈絡膜炎交感性眼炎，視神經炎。

消化器疾患：潰瘍性大腸炎，局部性腸炎。

血液疾患：再生不良性貧血，先天性溶血性貧血，顆粒性白血球減少症，血小板減少性紫斑病，小孩急性白血病，成人白血病，淋巴瘤。

肝疾患：急性肝炎，慢性肝炎(活動型)，肝硬變(初期且含腹水)。

神經疾患：急性腦脊膜炎，多發性神經炎。

腎疾患：由原發性或紅斑性狼瘡導致腎疾患之水腫、尿蛋白。

惡性腫瘍：淋巴肉芽腫。

外科疾患：休克，腦浮腫，麻醉時引起氣管痙攣，輸血時引起之副作用。

整形外科：骨關節炎，腱炎，腱鞘炎，滑液包炎。

【適應症】 糖副腎皮質素適應症，如 Addison 病，免疫性病，發炎病症，急性休克。

【使用禁忌】

- 一、全身性真菌感染。
- 二、對本藥過敏者。

【警語及注意事項】

- 一、曾有文獻報導於硬脊膜外注射(Epidural Administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
- 二、本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(Intracanal)或硬脊膜外(Epidural)注射給藥。
- 三、須謹慎使用之疾病：消化性潰瘍，具感染症者，精神病，糖尿病，結核性疾患，疱疹性角膜炎，白內障，高血壓，血栓症，脂肪栓塞症，電解質異常，甲狀腺機能低者，肝硬變，腎功能不全，重症肌無力(開始使用時症狀會增惡)。
- 四、長期使用引起之副作用：
 1. 臨時斷藥會產生發燒，肌痛，關節痛，身體不適諸症狀。
 2. 對眼部引起囊下內障，白內障，青光眼，可能傷害視神經，促使真菌或濾過性病毒二次性對眼部之感染。
 3. 引起精神錯亂，如欣快感，失眠，心神不定，個性改變，抑鬱，情緒不穩定。
 4. 使血壓升高，鹽、水份滯留，浮腫，鉀排泄過多，故治療期間補充鉀鹽，而限制鈉鹽。
 5. 可能引起穿孔性潰瘍，膿腫(Abscess)或化膿部位增惡，誘發感染大腸憩室炎，腸吻合，重症肌無力。
 6. 導致繼發性副腎皮質機能不足，使用時逐漸減低劑量。
 7. 引起骨多孔症，大腿骨及上腕骨之無菌性壞死，肌肉痛，關節痛。
 8. 引起器官硬化及甲狀腺官能不足病情惡化。
- 五、相互作用
 1. 與 Aspirin 合用須小心，有引起凝血原過少症(Hypoprothrombinemia)之報告。
 2. Phenytoin, Phenobarbital, Ephedrine, Rifampin 可促進本品新陳代謝，血中濃度降低，活性減少，因此與上述藥合用時應注意本品之劑量。
 3. 與抗凝血劑合用時，會降低其效果。
 4. 如現局部腫脹，關節運動受阻，發燒，身體不適等症狀係由敗血性關節炎引起時，需加用抗生素治療。
 5. 大劑量使用期間，加服抗酸藥可預防消化性潰瘍。
- 六、本藥會使潛伏性之阿米巴蟲又具活性，使用本藥應先治療阿米巴病。
- 七、使用本藥亦會影響 Nitroblue-Tetrazolium Test。
- 八、避免直接注射到感染部位，Unstable joint，同時經常關節內注射會傷害接合組織，注射時須緩慢。
- 九、使用本藥期間勿作天花疫苗接種。
- 十、孕婦或可能懷孕之婦女除非治療上的利益大於使用的危險性，以不用為宜，哺乳婦女不可使用。
- 十一、治療期間精神或生理上受到刺激時，本藥之劑量應酌予增加。
- 十二、應用本劑期間，多補充蛋白質。

【用法、用量】

本品可做靜脈注射、肌肉注射或關節腔注射，靜脈注射應緩慢。

一般靜脈及肌肉注射劑量--劑量依病情決定之，初劑量使用 0.5~9mg，可重複注射，直至產生預期效果，須延長治療時，每 3~4 小時一次，如未能控制病情，應停止使用改用其他藥治療。休克時，初劑量 20mg，以後劑量 24 小時內 3mg/kg，直至穩定，繼續使用 2~3 天後停藥。

本藥限由醫師使用。

【貯藏】 避光儲存於 25°C 以下並避免冷凍。

【包裝】

敏速平注射液 4mg/mL：每小瓶 1.5 公撮，100 小瓶以下盒裝。

敏速平注射液 5mg/mL：1 毫升、5 毫升安瓿裝、玻璃小瓶裝，100 支下盒裝。

敏速平注射液 4mg/mL，衛署藥製字第 027944 號

敏速平注射液 5mg/mL，衛署藥製字第 026804 號

委託者：榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路三段447號

製造廠：信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路22號