

“台裕”縮水蘋果酸甲基麥角新鹼 注射液

Methylergonovine Injection “Tai Yu”

【成分】

Each ml contains:

Methylergonovine Maleate 0.2mg

【作用】

本劑與 Ergonovine Maleate 有同等作用，唯其效力遠較 Ergonovine Maleate 為強，且作用之時間亦延長很久，本劑亦具有微弱之血管收縮作用，皮下或肌肉注射後 3~5 分鐘內，子宮即發生收縮作用。靜脈注射後 1/2~1 分鐘間，子宮即發生收縮作用。

【適應症】

- ①子宮出血之預防及治療。
- ②子宮收縮之促進。
- ③產後子宮出血。
- ④子宮收縮不全。
- ⑤流產。

【用法用量】

- 1.皮下或肌肉注射 - 每次 0.5ml~1ml (即 0.1mg~0.2mg)。
- 2.靜脈注射 - 應於 60 秒內緩慢注射之，其用量為 0.25ml~0.5ml (即 0.05mg~0.1mg)。
- 3.本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 1.禁忌 -
 - ①孕婦、②兒頭娩出前、③有既往對麥角製劑引起過敏反應之前歷者。
- 2.慎重投藥者 -
 - ①高血壓症患者心疾患或閉塞性血管障害、②妊娠中毒；③肝疾患及腎疾患之患者。
- 3.副作用 -
 - ①噁心、嘔吐、腹痛、下痢等症狀之出現；②血壓上升、頻脈或徐脈等症狀之出現；③頭痛嗜睡、口渴耳鳴或興奮等症狀出現；④胸部壓迫感等症狀出現。
- 4.使用時之注意 -
 - ①靜脈注射時若與升壓劑或麻醉劑並用時應特別小心使用，並應徐緩行之；②肌肉注射時應避免傷及組織及神經；③若欲連續使用，宜變換注射部位。

【賦形劑】

Benzyl Alcohol、Sodium Hydrosulfite、Maleic Acid、Thiourea、Water for Injection。

【貯藏方法】

25°C以下避光貯存。

【包裝】

1ml 安瓿裝，100 支以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL : (03)5826655 FAX : (03)5822389