

“南光” **汎胃定** 注射液 10毫克/毫升(發模梯定)
Famodine Injection 10 mg/ml "N.K." (Famotidine)

- 成分：Each ml contains :
Famotidine..... 10 mg
- 賦形劑：Aspartic Acid、Benzyl Alcohol、Mannitol、Water for Injection。
- 適應症：
住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。
- 用法用量：本藥限由醫師使用。
用量-每12小時注射20mg(2ml)，可酌予增減劑量。
用法：靜脈注射：
應藉下述方法稀釋後使用
快速注射時：20mg 的Famodine +適量的0.9% Sodium Chloride Injection, Sterile Water for Injection, 5% Dextrose Injection, 10% Dextrose Injection, Lactated Ringer's Injection, 5% Sodium Bicarbonate Injection
→5ml或10ml,然後注射2分鐘以上。
點滴注射時：20mg的Famodine +100ml的上列稀釋液，然後點滴15~30分鐘。
肌肉注射時：20mg/2ml不經稀釋直接注射。
- 注意事項：
 - 一、一般性注意事項：
治療時應充分觀察並依病況使用最小劑量，若未見療效時，請改用其他療法。
 - 二、下列患者，請慎重投與：
 1. 有藥品過敏症病史的患者。
 2. 有腎不全之患者。
 3. 有肝障害之患者。
 - 三、副作用：
 1. 過敏性-偶有發疹、皮疹、蕁麻疹(紅斑)，當有這些症狀時，請中止投與。
 2. 血液-偶有白血球減少。
 3. 消化器-偶有便秘、下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐等，又極罕見腹部膨滿感，食慾不振等症狀。
 4. 循環器-鮮有脈博數增加、血壓上昇、顏面紅潮、耳鳴等。
 5. 肝臟-偶有S-GOT、S-GPT之上昇等肝機能異常。
 6. 精神神經系-偶有全身倦怠、無力氣感，又極罕見頭重感、頭痛等。
 7. 其他-鮮有月經不順、顏面浮腫等。
 - 四、孕婦、授乳婦之投與
關於懷孕中投與之安全性尚未確立，孕婦或有可能懷孕的婦女，最好不要投與。
又因為會移行至母乳中，所以投與授乳婦時，應注意不要授乳。
 - 五、小兒之投與
對於小兒之安全性尚未確立。
 - 六、其他
由於本品之投與會隱蔽胃癌引起的症狀，因此應在確認非惡性後始能投與。
- 儲藏：
本品應於室溫下貯存之。
當本品被稀釋後，於室溫下亦能安定48小時。 衛署藥製字第033072號
- 包裝：2ml安瓿，2、4、10ml小瓶，100支以下盒裝。 G.M.P.:G-2014



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845

