



鎮痛·鎮痙劑

FCI-003
衛署藥製字第08642號

保賜康

注射液

Fucon

Injection

胃、十二指腸潰瘍常併發副交感神經（迷走神經）機能亢進之症狀發生。因此，從抑制副交感神經有作用之物質如Atropine Scopolamine等之 Alkaloid而合成之數種第四級 Ammonium化合物，其中之一的 Hyoscine-N-Butylbromide被證實為副作用最少，對副交感神經節之神經傳導具有特異之遮斷作用，對胃腸管、膽管、尿路等之鎮痙作用，有顯著的效果。

【成分】

每安瓿(1 mL)中含：

Hyoscine-N-Butylbromide 20mg

【賦形劑】

Propyl Paraben、Methyl Paraben、Sodium Chloride、Benzyl Alcohol、Water For Injection。

【適應症】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、十二指腸炎、賁門痙攣、食道痙攣、痙攣性便秘、膽管之痙攣及運動障礙、尿路之痙攣。

【用法·用量】

通常成人一次1mL(20mg)，一日3~5次，皮下、肌肉、靜脈點滴注射。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】

有極少數人因體質的關係，使用本藥時偶而有暫時性的心悸、口渴、頭暈、便秘及眼睛調節障礙（瞳孔散大）等情形，此為一過性關係，減少用量即可避免之。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

10, 50, 100安瓿裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04)26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2143216