

葛來斯樂 10%

Glycerosteril 10%

衛署藥輸字第017728號
本藥限由醫師使用

[成份] 每公升含有

Glycerol	100 g
Glucose monohydrate for parenteral use	27.5 g
△Anhydrous glucose for parenteral use 25.0 g	

賦形劑：

Sodium chloride	4.5 g
Hydrochloric acid	0.1-0.5 ml
Water for injection	Q.S
Theoretical osmolarity	=1379mosm/l

[適應症]

降低顱內壓、腦水腫。

[禁忌症]

腦出血、滲透過速的昏迷、伴隨著低沉滲透紅血球之溶血性貧血、代償機能衰退之心肌富能不足、腎功能不全(諸如少尿症、無尿症)及一般體液之損耗(脫水症)。

註解：要控制血清(漿)及水份的平衡。

[副作用]

常見的副作用有頭痛、噁心、口渴及倦怠感。

註解：20% Glycerol輸注速度每分鐘超過2ml時，偶有溶血及血尿現象。

[用法用量]

靜脈輸注，70公斤體重，每小時125ml，即以每分鐘40滴之速度輸注。

最高劑量：70公斤體重，每天500ml。

[使用期間]

Glycerosteril 10%可視治療之需要而給予輸注，但最多不得超過14天。

[注意事項]

- 如有玻璃瓶破損或藥水混濁時皆不得使用。
- 超過有效期限不得使用。
- 置於兒童取不到之處。

[包裝]

250ml、500ml 玻璃瓶裝。每10瓶一箱。

藥商：台灣費森尤斯卡比股份有限公司

地址：台北市10653仁愛路三段32號5樓



**FRESENIUS
KABI**

製造廠：Fresenius Kabi Austris GmbH

廠址：Hafnerstraße 36, A-8055 Graz, Austria

次級包裝廠：Fresenius Kabi Austria GmbH

廠址：Am Gewerbepark 6, 8402 Werndorf, Austria
