

含乳酸鈉與電解質的細胞外液補充劑
“南光” 哈 福 曼 注射液

Haforman Injection "N.K."

□特 點：

1. 可以當做全身性的鹼化劑。
2. 內含碳水化合物，可恢復血液中的葡萄糖含量並供給熱能。

□成 分：Each ml contains:

Sodium Lactate (60%).....	5.166 mg
(eq. to Sodium Lactate, Anhydrous.....)	3.1 mg
Sodium Chloride.....	6 mg
Potassium Chloride.....	0.3 mg
Calcium Chloride, Dihydrate.....	0.2 mg

□特 性：

- | | |
|--------------------------------|---|
| ◆ 9 Calories/L | ◆ Cl ⁻ : 109 mEq/L |
| ◆ Na ⁺ : 130 mEq/L | ◆ CH ₃ CH(OH)COO ⁻ : 28 mEq/L |
| ◆ k ⁺ : 4mEq/L | ◆ pH : 約6.7 |
| ◆ Ca ²⁺ : 2.7 mEq/L | ◆ Osmolarity : 273 mOs/L |

□適應症：

循環血流量的減少所引起乏尿及腎機能不全，一般水份不足症、開刀前後之水份補給、小兒下痢症、高熱消耗性疾患、火傷、骨折時、酸中毒。

□用法用量：本藥限由醫師使用。

通常成人一日250~1000ml，兒童酌減，藉由靜脈輸注方式投與。

□注意事項：

一. 禁忌：

本品因含乳酸鹽，故不可用於治療乳酸性酸中毒。

二. 警告：

1. 本品因含有鈣離子，若病患有輸血的需要時，應注意本品不可與血液共同使用同一個輸液裝置，否則會造成血液凝固。
2. 本品含鉀離子，使用於高鉀血症、嚴重腎衰竭及有鉀滯留現象的病人身上須特別小心。
3. 本品含鈉離子，須小心投與在充血性心衰竭、嚴重腎機能不全，及鈉滯留所引起的水腫病患身上。

4. 本品含乳酸根離子，對於代謝性或呼吸性鹼中毒病患，及乳酸根離子量增加或乳酸根利用機能損害的嚴重肝功能不全病患，須特別小心使用。

三. 使用方法：

(1)取用時：

- a. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- b. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法：

- a. 請依輸液套使用方法正確使用。
- b. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- c. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□儲 藏：本品應存放於陰涼處所，避免過冷與過熱。

□包 裝：100ml, 250ml, 300ml, 500ml, 1000ml玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠軟袋裝，
100支以下盒裝。

衛署藥製字第 044013 號

G.M.P.:G-7258