

“信東” 利速復注射劑 (西華定)

Lisacef for Injection “S.T.” (Cephadrine)

Lisacef (cephradine) 是一半生合成之Cephalosporin抗生素，具廣效的抗革蘭氏陰陽性菌及對ampicillin有抗藥性之微生物之作用。於體外試驗證明Lisacef之抗菌作用類似cephalosporin，即抑制細菌細胞壁之合成。

Lisacef 主要抗下列微生物：

革蘭氏陽性菌：葡萄球菌 (包括正負凝血酶和產生盤尼西林酶之菌屬)，鏈球菌 (包括 β -溶血性鏈球菌)，腸球菌、雙球菌。革蘭氏陰性菌：大腸桿菌、克萊勃士桿菌屬、腸球菌、嗜血流行性感菌、志賀桿菌、沙門桿菌、奈瑟氏菌。

Lisacef 對下列微生物感染症有效：

- 呼吸道之感染：由於肺鏈球菌和克萊勃士桿菌所引起的大葉肺炎。
- 支氣管炎和支氣管擴張症、扁桃體炎、咽炎。
- 中耳炎 (由於 β -溶血性鏈球菌所引起的)、鼻竇炎。
- 由於腸球菌和大腸菌所引起的尿道感染。
- 皮膚和軟組織之感染：膿腫、癬病、膿疱病。

【成分】

每瓶含有

Cephadrine

0.25 gm, 0.5gm, 1 gm (力價)

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【副作用】

如其他Cephalosporins一樣，其主要副作用為腸胃不舒服，偶而產生過敏，病人以前曾產生過敏、氣喘、乾草熱、蕁麻疹之病歷記錄，則較易產生過敏。胃腸道之副作用：舌炎、嘔吐、腹瀉、胃灼熱、腹痛。極少數有輕微蕁麻疹或皮疹、搔癢與關節痛。

偶而有某些實驗變數暫時的改變，如嗜伊紅血球增多、白血球減少。其他副作用：眩暈、胸收縮之感，非易感微生物引起陰道炎。這些副作用都很輕微，不致於需停止治療。

【禁忌症】

病人已知或懷疑對Cephalosporins和Penicillins有過敏者應禁用。

【警語】

Cephalosporins用於對Penicillin過敏之病人應注意，依據臨床和實驗結果證明Penicillin和Cephalosporins之間有部份交叉過敏反應，縱使這種過敏反應極罕見，但曾有病歷報告，大部份於注射後，偶而會引起過敏反應。

懷孕與授乳婦：對懷孕者之安全性還沒確定，因此在考慮此藥對孕婦之益處時，應同時考慮其對胎兒之危險性。

【注意事項】

對腎功能嚴重受損者，必須依據腎功能試驗，減少Cephalosporins之劑量，與其他具有腎毒性藥物併用會增加腎之毒性，所以必須隨時檢查腎功能，長期服用抗生素易引起非易感細菌之過度生長，因此必須採取適當的治療措施。給Cephalosporins會干擾某些實驗室試驗，用Benedict, Fehling和Ciinitest方法，會引起假陽性糖尿，但用酵素方法則不會引起，用Cephalosporins治療期間，直接Coombs test也出現假陽性。

【用法·用量】

通常成人一日量2~4 gm均分四次，小孩一日量50~100 mg/kg均分四次，施行肌肉注射或緩慢靜脈注射，對於難治性重症應酌情增量。本劑溶解後應於2小時內使用，必要時可保存於5°C並應於24小時內使用。溶液顏色若轉變成黃色為正常現象，不會影響藥效。

本藥限由醫師使用。

【包 裝】

0.25g/v , 0.5g/v , 1.0g/v 100支以下裝

衛署藥製字第 035929號 G-3263



信東生技股份有限公司
桃園市介壽路 22 號

IL004②