

“南光” 立克痛 注射液 50 毫克/毫升

Limadol Injection 50 mg/ml "N.K."

Limadol 是一種強效性的止痛劑，主要用於傷痛、骨折、嚴重神經痛、腫瘤痛、心臟病發作...等等的劇痛，而不應該用於輕微的疼痛。本品作用迅速，藥效可持續數小時之久。

□ 成分：

Each ml contains:

Tramadol Hydrochloride..... 50 mg

□ 賦形劑：Sodium phosphate Dibasic、Potassium phosphate Monobasic、Water for Injection。

□ 適應症：嚴重之急慢性疼痛。

□ 用法用量：強烈疼痛時應調整劑量，除非醫師另有處方，否則依下列劑量投與

◆ 注射：(單一劑量)本藥限由醫師使用。

注射方式	成人及14歲以上青少年	一歲以上孩童	備 註
靜脈注射	1-2ml(50~100mg)	1~2mg/kg	靜脈注射須緩慢注射或用輸注射液稀釋後點滴。
肌肉注射			
皮下注射			

◆ 通常每天的劑量不得超過400mg。

◆ 肝或腎功能受損者須調整劑量。

□ 禁忌：

1. 與酒精、安眠藥、止痛劑或其他中樞神經系統作用藥物併用時會造成急性中毒。
2. 懷孕與哺乳期間，應慎重考慮其危險性後方能投與。
3. 對鴉片類藥物敏感的病人應小心使用。
4. 對已知患有痙攣的病人，在本藥治療期間須小心監測。

□ 副作用：

1. 發汗、眩暈、噁心、嘔吐、口乾以及疲勞。
2. 罕有病例會對心臟血管系統造成影響(例如：心悸、姿勢性低血壓或心臟血管虛脫)，尤其在靜脈注射時。
3. 曾有發生痙攣之病例。
4. 當病人身體過勞時，特別容易引起副作用。

□ 交互作用：

1. 與中樞神經系統之藥物(例如：鎮靜劑、安眠藥)併用，可能會加強其鎮靜作用，因此，同時也加強了本身的止痛效果。
2. 不可與單胺氧化酶(MAO)抑制劑併用。

□ 注意事項：

1. 偶爾於麻醉時，Limadol 的使用量若超過建議劑量甚多，則不排除有抑制呼吸的可能性。
2. 即使是按照指示給藥，亦可能會影響病人之反應力，例如：駕駛汽車與操作機械之能力，尤其是與酒精一起併用時。
3. 因長期使用可能會產生依賴性，故醫師必須決定治療時間的長短以及是否要暫時停藥。
4. Limadol 不可長期給與而超過治療之所需。

□ 包裝：1ml、2ml安瓿，100支以下盒裝。

衛署藥製字第 039058 號 G.M.P.:G-4916



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL: (06)5984121(代表) FAX: (06)5981845