

梅得柏朗注射液

Metoperan Injection

【成份】 每mL含：

Metoclopramide HCl.....5mg
賦形劑：Benzyl Alcohol, Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide,
Hydrochloric Acid, Water for Injection

【作用】

本劑因作用有選擇性，對中樞神經系、自律神經系及循環系不發生影響，又本劑因能選擇腦中主司消化器官機能調整的部位作用故與副交感神經遮斷劑、及副交感神經興奮劑完全不同，另外對胃分泌、胃酸不影響。

【適應症】

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

【用法用量】

通常成人一日1-2Amp，肌肉或靜脈注射，依年齡、症狀適宜增減之。

本藥限由醫師使用。

【配合禁忌】

本劑和鹼性注射劑混合會產生混濁或沈澱。

【注意事項】

極少數兒童可能發生嗜眠或輕微肌肉緊張，此為暫時性現象，停止用藥並保持安靜，症狀即消失，孕婦禁用。

【警語】

1. 使用含metoclopramide成分藥品可能造成遲發性運動障礙 (tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量 (total cumulative dose) 有正相關性，且分析本品之使用型態，約20%病人使用超過12周，故不建議長期(超過12週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生tardive dyskinesia之風險者。
2. 投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用metoclopramide藥品相關的不良反應如肌張力失調 (dystonias) 及錐體外路徑反應 (extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

【儲存】

請儲存於30°C以下。

【包裝】

2mL×10Amp 2mL×50Amp 2mL×100Amp

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號