

"生達"瘍寧(奧美拉唑)凍晶注射劑 40 公絲

Omezol (Omeprazole) Lyo-inj.40mg"Standard"

衛署藥製字第 042390 號 G-6355 Code No.I0-01 2213790

"生達"瘍寧凍晶注射劑係"生達"公司繼 H₂ 組織胺抑制劑後，又一精心研發之胃酸分泌抑制劑。本品可高選擇性的抑制質子幫浦(Proton pump)，所以可抑制胃壁細胞上的 H⁺，K⁺ATPase 酵素(此酵素乃胃酸形成之最後步驟)，在基礎胃酸或因刺激所產生之胃酸分泌抑制上效果優異。

「成分」:Each Vial contains:

Omeprazole sodium 42.6mg
(eq. to Omeprazole 40 mg)

「特點」:

- 1.療效優異，對於 H₂ 組織胺拮抗劑無效之病人，本品仍可發揮優異療效。
- 2.作用迅速，一天一次即可產生作用。
- 3.耐受性佳。

「適應症」:

下列病症無法以口服藥物效有治療時之取代療法:
十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎及
Zollinger-Ellison 症。

「用法用量」:

本藥限由醫師使用。

重症患者無法以口服方式投與時，推薦本品靜脈注射，劑量 40mg，一天一次。

如治療需持續三天以上時，推薦劑量減至一天 10~20mg。Zollinger-Ellison 症患者，劑量視個別情況加以增減。

本品注射溶液以 Omezollyo inj.加上所附溶劑(10ml/Amp)調製而成，調製後限於四小時內使用，只限靜脈注射，且不可摻雜其他溶劑，緩慢注射時間需持續 2.5 分鐘以上，每分鐘最大速率不可超過 4ml。腎、肝功能障礙患者及老年人不用調整劑量，孩童尚無使用經驗。

禁忌:對此成分過敏之患者。

「注意事項」:

- 1.懷疑是胃潰瘍惡化患者應立即就醫，以免因為治療後症狀緩和而延誤診斷。
- 2.胃部腫瘤患者不得使用。
- 3.長期治療患者偶而會發生萎縮性胃炎。
- 4.孕婦及授乳婦:除非必要不應使用，動物實驗尚無胎兒毒性或致畸胎作用。
- 5.本品長時間使用之安全性資料尚未確立，建議使用時間不宜超過五天。

「藥物交互作用」:

本品會延長 Diazepam、Warfarin 及 Phenytoin 之肝臟排除時間，所以若是這些藥品與本品同時使用必須減量且追蹤觀察。雖然在健康成年人並未發現本品與 Theophylline 或 Propranolol 之間有交互作用，但是如果併用其他需經由肝臟細胞色素 P-450 酵素系統代謝之藥物，仍有可能產生交互作用。由於本品長期使用會抑制胃酸分泌，對於一些吸收會被胃酸酸鹼值影響之藥品(例如 Ketoconazole、Ampicillin esters、鐵鹽)，仍有可能與本品發生交互作用。

「副作用」:

本品耐受性良好，常見副作用，例如頭痛、下痢、腹痛、噁心、嘔吐、上呼吸道感染、眩暈、發疹、便秘、咳嗽、無力及背痛之發生率在 1%左右，這些症狀均很短暫且輕微，同時與本品之治療沒有一定關聯。

「藥物過量」:

目前尚無人體使用過量之資料，亦沒有過量時之特殊解毒劑，單一靜脈注射到 80mg 仍有很好的耐受性，而且每天靜脈注射 200mg，連續三天，劑量累積到 520mg，皆還不會發生副作用。

「包裝」:



GMP 藥廠 ISO9001
生達化學製藥股份有限公司
臺灣省台南縣新營市土庫里六號之二十

1 小瓶加 1 安瓿溶劑，100 支以下盒裝