

“政德” **樂法勝** 乾粉注射劑
1 公克(賜福力欣)

Roles powder for Injection 1gm “Gentle” (Cephalexin)

Cephalexin 係一種半合成性頭孢子菌素 Cephalosporin 抗生素具有廣效性抗菌作用，其主要係抑制細菌，細胞壁的合成，抗菌範圍廣泛包括 G (+)，G (-) 且對 Penicillin 耐性菌有效與已有的抗生素間並無交叉耐性，高濃度移行至各器官尤其是對腎、肝、肺及膽、高濃度自尿中排泄。對下列細菌呈現殺菌效果乙種溶血性及其他鏈球菌(β -hemolytic and other streptococci)腸球菌(Enterococci)中許多菌株如糞鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌、肺炎克雷白氏桿菌(Klebsiella pneumoniae)，流行性感胃嗜血桿菌。

成份： 主成分：
每 Vial 含 Cephalexin (as sodium)-----1000mg (potency)
賦形劑：無

適應症： 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量： 通常成人每日 2~8gm，幼兒每日每公斤體重 50~100mg，腎功能不全者按下表調整劑量：

Creatine 清除劑(ml/min)	最大成人劑量(g/dag)
20~50	3
5~20	1.5
<5	0.5

分次行肌肉或靜脈注射，本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 1.一般注意事項：須先做休克之過敏試驗。
- 2.禁忌：對本藥曾發生休克之患者。
- 3.慎重投與：
 - (1)曾對 Penicillin 系或 Cepha 系藥物過敏者。
 - (2)本人或雙親及兄弟中有人具有支氣管痙攣、發疹、蕁麻疹等過敏性體質者。
 - (3)嚴重腎障害之患者。
 - (4)經口攝取不良或非經口營養之患者、高齡者、全身狀況不良之患者。
- 4.副作用：
 - (1)休克，須小心觀察若有不快感、口內異常感、耳鳴、眩暈、便意、噁鳴、發汗等現象應停止用藥。
 - (2)過敏症，發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢、發熱、淋巴節腫脹、關節痛等症狀應停用並適當處理。
 - (3)血液：顆粒球減少，好酸球增多，血小板減少，溶血性貧血。
 - (4)肝臟：出現黃疸、SGOT、SGPT、alkaline phosphatase 上昇。
腎臟：間有 BUN creatinine 上昇，乏尿、蛋白尿等腎障礙之現象出現，須詳細觀察若有異常現象出現須適當處置。
 - (5)胃腸：發熱腹痛、白血球增多、伴有粘液及血液便急性下痢症狀的嚴重大腸炎、內視鏡檢查可看見偽膜斑形成，出現偽膜性大腸炎。腹痛及頻回的下痢應即停藥並做適當處置，此外有噁心、嘔吐、下痢、軟便、腹痛、食慾不振、胃部不快感。
 - (6)菌交代症：口內炎、念珠菌症。
 - (7)維他命缺乏症：維他命 K 缺乏症(低 Prothrombin 血症，出血傾向) 維他命 B 群缺乏症(舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎)。
 - (8)其他：頭痛、目眩、全身倦怠。
- 5.對孕婦之安全性尚未確立，須基於有益性之判斷再使用。
- 6.臨床檢查值之影響。
 - (1)除了 Test Tape 外 Benedict 氏、Fehling 氏液及 clinitest 的尿糖檢查值呈偽陽性。
 - (2)Creatinine 的測定，使用 Picric acid 反應的測定值會上升。
 - (3)BCG 法測定 Alubumin 會與 Alubumin 及 BCG 結合發生競合阻害測定值減低。
 - (4)直接 coombs 試驗呈陽性。
- 7.使用上注意：
 - (1)靜脈內大量投與會引起血管痛、血栓靜脈炎，預防方法須注意注射液之調製，注射部位及注射方法，減慢注射速度。
 - (2)溶解後儘速使用，若須保存時在室溫可保存 24 小時。
- 8.室溫遮光保存有效期間二年。

包裝：100 支以下小瓶盒裝。(每瓶 1 公克裝)



政德製藥股份有限公司
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號