

“信東”樂麗康注射液(碳酸氫鈉)

Rolikan Injection (Sodium Bicarbonate)

【成分】

主成分：每 ml 含有 NaHCO_3 70mg

賦形劑：E.D.T.A.(2Na)、Water for Injection。

【藥理作用】

- 對於體液中的酸性物質停滯而引起之酸中毒，本藥可中和之，使回復正常的液性。
- 注射本藥對於膀胱、腎盂、腎臟內之粘膜、細尿管之上皮細胞亦呈現與上者相同之效果。
- 本藥可以中和呈酸性之靜脈注射液，例如大量注射葡萄糖注射液 ($\text{pH}=3.6 \sim 4.2$) 會使體液 pH 值降低，若併用本藥則可防止中毒。
- 本藥可使鹼性色素劑之媒液有強力的殺菌效果，例如注射 Acridine 色素時，併用本藥可達強力殺菌效果。

【適應症】

酸性中毒疾患、濕疹、蕁麻疹等皮膚疾患、胰島素休克之緩和、孕吐、暈車、大腸菌性尿路疾患、結核性膀胱炎、防止由葡萄糖注射液等引起之體液酸化。

【用法・用量】

每次 1~5g 皮下或靜脈注射。

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 患有心臟疾病、高血壓症、腎機能障礙、末梢和肺浮腫及妊娠中毒者，應慎重投與。
- 本藥為鹼性，若與其他種藥物配合使用易引起變化，須十分注意。
- 須慎重投與者如：
嚴重消化道潰瘍、腎障礙、心機能障礙、肺機能障礙、低氯性的鹼中毒等電解質失調。
- 與鈣離子會生沈澱現象，故不要與鈣鹽製劑混合。
- 皮下注射時為避免影響神經組織，須注意下列事項：
 - 注射時須避開神經走行部位。
 - 重複注射時注射部位須變化。
 - 對小孩或嬰兒最好不要使用本藥。
 - 注射時如患者感覺痙攣或血液有逆流現象，須將針抽出換其他部位注射。

【使用之注意事項】

(一)取用時：

- 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

- 請依輸液套使用方法正確使用。
- 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(coring)產生碎片。
- 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

(三)若須配合其他藥品使用時，應觀察藥液配合狀況，若有發生沈澱、混濁或其他異常現象時，請勿使用。

【副作用】

- 過量投與而有下列症狀出現時須減量或停藥：
 - 血紅素減少、紅血球減少、鹼中毒時。
 - 強直性痙攣時。
- 神經系：
極少數病例有口唇麻木感或知覺異常現象。
- 其他：
極少數病例有發熱、全身發冷、不快感、貧血、噁心、脈搏減慢現象。

【包裝】

20 毫升安瓿瓶、20 毫升塑膠安瓿裝，每盒 100 支以下。

200、250、300、500 毫升注射瓶裝。

衛署藥製字第 027456 號



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路 22 號

54180050 ⑨

貯存於室溫 25 °C 以下，避免冰凍。