



“南光” 沙林 注射液 0.45 %

Saline INJECTION 0.45 % "N.K."

□ 成 分：Each mL contains：

Sodium chloride.....4.5 mg

□ 賦形劑：Water for Injection。

□ 特 性：

1. 因供給的水分比排泄食鹽所需者還多，故可用以評估腎臟的狀況。
2. 亦可用於治療高滲透性糖尿病 (Hyperosmolar Diabetes)，當使用Dextrose 是不適宜時。
3. 當需要大量的液體而不要過量的鈉離子時。

□ 適應症：

鈉、氯離子之電解質與水分補給。

□ 用法用量：本藥限由醫師使用。

用法 — 可藉皮下、肌肉或靜脈注射投與。

用量 — 通常成人一次500~1000 mL，可視實際需要酌予增減。

□ 注意事項：

(1) 取用時：

- a. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- b. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(2) 輸液套選用及插入法：

- a. 請依輸液套使用方法正確使用。
- b. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- c. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□ 儲 藏：本品應儲存於 25°C 以下。

□ 包 裝：150，250，500，1000 mL 塑膠軟袋裝，100支以下盒裝。

衛署藥製字第 039604 號 G.M.P.:G-5140



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號、1001-1號

TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845