

“信東” **沙特** 靜脈點滴注射液 5 毫克/毫升
(梯尼達諾)

Sata Injection for Intravenous Infusion 5mg/ml (Tinidazole)

【成 分】

Each ml 含：

Tinidazole.....5mg

【作 用】

本品主成分 Tinidazole 除了治療阿米巴蟲、毛滴蟲和梨形鞭毛蟲所引起之感染症有宏效外，對於厭氧菌屬(如 Bacterioides fragilis, B. melaninogenicus and Fusobacterium spp.)以及多種厭氧菌屬亦具有抗菌作用。

【適 應 症】

預防外科手術之厭氧菌感染。

【用法·用量】

以每分鐘 5ml 靜脈注射本品 100ml，即 20 分鐘用畢，開始使用本品時每隔 8 小時靜脈注射 100ml。

5 ~ 12 歲孩童之劑量為成人劑量之一半。

外科手術前可隨即施予靜脈注射本品 100ml。

手術後 8 小時，再予靜脈注射本品 100ml，持續使用一週。

本藥限由醫師使用。

【禁 忌】

孕婦、授乳產婦、未滿五歲小孩、惡血質病患、癲癇、神經炎。

【副 作 用】

胃腸不適、嘔吐、厭食、口苦感、頭痛、困倦、皮膚疹、可逆性嗜中性白血球減少症、深色尿。

本品應避免陽光照射。

【使用之注意事項】

(一) 取用時：

1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(二) 輸液套選用及插入法：

1. 請依輸液套使用方法正確使用。
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(coring)產生碎片。
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【藥物相互作用】

·本品與酒精合用時，會導致精神惑亂，因此使用本品時，請勿喝酒。

·本品可增強 Warfarin 之抗凝血作用，合用時應注意調整劑量。

·與其他抗菌劑之相互作用，尚未清楚。

·本品可以和以下藥劑配合使用。

Invert sugar 10% solution

Sodium Chloride Isotonic solution

5% Glucose solution

Cefuroxime Sodium

Benzyl Penicillin Sodium

Ampicillin Sodium

Gentamicin Sulfate

Tobramycin Sulfate

Clindamycin Hydrochloride

Doxicycline

Cefoxitin

【包 裝】

100ml (500mg)、250ml (1250mg)、300ml (1500mg)

500ml (2500mg)、1000ml(5000mg)瓶裝

衛署藥製字第 032122 號



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路 22 號