

體 液 用 藥

“濟生”

舒 力 得 注 射 液

SORLATE INJECTION

“CHI SHENG”

成 分 Each ml contains:

主成分

Sodium Chloride..... 6 mg
Potassium Chloride.....0.3 mg
Calcium Chloride Dihydrate.....0.2 mg
60% Sodium Lactate.....5.17mg
(equivalent to Sodium Lactate 3.1mg)
D-Sorbitol..... 50 mg

賦形劑

Water for injection

電解質組成(mEq/L):

Na⁺130, K⁺4, Ca⁺⁺ 3, Cl⁻109, Lactate⁻28。

PH: 5.5~7.5。

滲透壓比: 約2

作 用

- 1.本藥之電解組成與細胞外液近似,可作為水份,電解質及糖質之補給用。
- 2.手術、休克引起之循環血液量之損失或體液之喪失,如適時使用與血漿或細胞外液之電解質組成近似之本藥,可得較佳療護效果。
- 3.本藥所含之乳酸鈉,在體內代謝成HCO₃⁻,能補正酸中毒症。
- 4.本藥所含之Sorbitol其代謝與Insulin無關,且不受手術前、手術後之影響,為能源補給之良藥。

適 應 症

循環血液量及組織間液減少時細胞外液之補充劑,代謝性酸中毒的治療及能量補給。

用 法 用 量

一次500~1000ml靜脈點滴注射,注射速度以Sorbitol計算每小時每公斤體重以0.5g以下為宜。

本藥限由醫師使用

注 意 事 項

- 1.禁忌: 乳酸血症患者,遺傳性果糖不耐症患者。
- 2.慎重投藥: 因腎疾患而致腎不全之患者,心不全患者,重症肝障害患者,高張性脫水症患者,因閉塞性尿路疾患而致尿量減少之患者。
- 3.副作用: 大量急速給藥時可能引起腦浮腫、肺水腫、末梢浮腫。
- 4.適用上注意: 因含有鈣鹽,如與加檸檬酸鹽之血液相混,可能引起凝血;與磷酸及碳酸離子能生成沈澱;故不宜與含有此等成份之藥品配合。藥液如不澄清,絕不可使用。
- 5.取用時:
 - (1)運輸過程中,容器可能因受重擊、震動,而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時,請勿使用。
 - (2)若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時,請勿使用。
- 6.輸液套選用及插入法:
 - (1)請依輸液套使用方法正確使用。
 - (2)請使用附有過濾裝置之輸液套,導入針應以垂直方式插入橡皮塞,插入後請勿扭轉,以免因針割(Coring)產生碎片。
 - (3)使用前請再檢視,確定無異物後,方可使用。

包 裝

250ml、500ml、1000ml 玻璃瓶裝、塑膠瓶、塑膠軟袋裝
100支以下包裝

儲 存

玻璃瓶及塑膠袋應避光儲存於25°C以下。

塑膠瓶應避光儲存於40°C以下。

衛 署 藥 製 字 第 040045 號



CHI SHENG

濟生醫藥生技股份有限公司

CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD.

新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號

3434-06

電話: (03) 5983811