

綜合電解質注射液  
“大塚” 台大 5 號 注射液  
Taita No.5 Injection “Otsuka”

衛署藥製字第 022682 號

本藥限由醫師使用

台大 5 號注射液，係根據台大醫學院附設醫院小兒科之處方，製成之產品。為含有葡萄糖、氯化鈉、醋酸鈉、醋酸鉀、氯化鎂、磷酸二氫鉀之綜合電解質及熱能補充維持液。

[組成]: W/V%

成分	mg/mL	成分	mg/mL
NaCl	0.82	MgCl <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O	0.30
CH <sub>3</sub> COOK	0.59	KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	1.63
CH <sub>3</sub> COONa	1.80	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	100

賦形劑: Water for injection、Sodium Bisulfite、Acetic Acid

[電解質量]:

電解質 mEq/L						Glucose g/L	Osmolality mOsm/L	pH
Na	K	Mg	Cl	Acetate	Phosphate m mole/L			
36	18	3	17	28	12	100	669	4.0~7.5

[適應症]:

手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充、維持液。

[用法·用量]:

通常一次 400~1200mL，末梢或中央靜脈注射，小孩依體重定之。

[注意事項]:

(1)取用時:

- ①運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或膠塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ②本品為無色~淡黃色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法:

- ①請依輸液套使用方法正確使用。
- ②請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- ③使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

[包裝]:

250、400、500、1000mL 塑膠瓶裝、PP 軟袋裝。

[貯存]:

30°C 以下貯存。

[有效期限]:

請見容器或外箱上之標示。



藥商/製造廠: 台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠  
地址: 桃園市中壢區吉林路 15 號