

“台裕” **安西諾隆** 注射液 4%

Triamcinolone Suspended Injection “Tai Yu”

【成分】

Each ml contains:

Triamcinolone Acetonide..... 40mg

【適應症】

變形性關節炎、外傷性關節炎、脊椎炎、腱炎、腱周圍炎、坐骨神經痛、尋常性濕疹、支氣管氣喘、皮膚炎。

【用法用量】

1.成人：

- (1) 關節內注射每次 2.5mg ~ 40mg，若有症狀再出現時，再作第二次或第三次注射。
- (2) 肌肉注射每次 40mg ~ 60mg，若有症狀再出現時，再作第二次或第三次注射。

2.兒童：

(六歲以上)肌肉注射每次每公斤體重用 30mcg ~ 200mcg (即 µg)，每日一次至每週注射一次。

3.本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 1.在使用前要充分振搖以得均勻的懸濁液，並且要立即注射，以免在注射筒內產生沈著。
- 2.不可行靜脈或者皮肉注射。
- 3.急慢性感染症使用時，請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
- 4.對消化管障害如胃腸潰瘍務請特別注意。
- 5.因主要副作用引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
- 6.糖尿病患者使用時，有增加 Insulin 藥量的必要者請注意。
- 7.對於有精神病因素者多加注意。
- 8.使用本劑期間，請充分補充蛋白質。
- 9.曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
- 10.本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

【賦形劑】

Sodium Chloride、Sodium Carboxymethyl Cellulose、Tween 80、Benzyl Alcohol、Water for Injection。

【保存方法】25°C以下避光貯存。

【包裝】

10 毫升玻璃小瓶裝、1 毫升玻璃安瓿裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL : (03)5826655 FAX : (03)5822389