

華興製藥

抗帕金森氏症劑

“華興” **愛達寧** 錠 2 公絲
(比培立汀)
Akin Tablets 2mg “H.S.”
(Biperiden)

衛署藥製字第 038650 號

《簡介》

(G-4704)

Biperiden HC1 是一種末梢抗膽鹼作用劑，具有抗分泌、抗痙攣和散瞳作用，可用於中樞動脈硬化、自發性及腦炎後的帕金森氏症，也可用於緩解因藥物，如：Phenothiazine 衍生物與 Reserpine 誘發引起之錐體外束症候群治療劑。

《成分》

每錠含：Biperiden Hydrochloride2mg

《適應症》

帕金森氏症。

《用法用量》

1. 治療由小劑量開始，然後逐漸增加劑量，一般依據治療效能和副作用而定。
2. 口服劑量一般一天 1~3 次，一次一錠；對帕金森氏症患者；初劑量是一天 3~4 次，一次一錠，然後逐漸增加劑量，至最大量每天八錠（16mg）。
3. 本藥需由醫師處方使用。

《注意事項》

1. 對 Biperiden HC1 具高敏感性患者，禁用本藥。
2. 凡有窄角性青光眼、胃腸道狹窄、巨結腸者，禁用本藥。
3. 目前尚無畸胎之證據，但使用於孕婦應特別注意，且尚未清楚此藥是否會從乳汁中分泌出來，所以對於授乳婦投與此藥時，需給予警告。
4. 對小孩的安全性及療效，尚未確定。
5. 請放置於陰涼處避光保存。

《副作用》

1. 會有口乾、視野模糊、嗜眠、精神欣快或定向力障礙，尿滯留、姿勢性低血壓、便秘、精神激昂、行為障礙等副作用發生。
2. 若是經由口服投予，會產生胃腸刺激，可藉由在用餐時或用餐後投予，避免胃腸刺激。

《交互作用》

本品與抗膽素激導性精神科藥物、抗帕金森氏症藥和解痙劑併用會加強中樞神經系統和週邊副作用。與 Quinidine 併用會加強抗膽素激導性作用。

《包裝》

4~1000 錠瓶裝及鋁箔盒裝。

本品代號：Akin157

華興化學至藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04) 8832121~6