


Trospium chloride是具有類Atropine之抗Acetylcholine作用，抑制副交感神經末梢，而其作用之特異點是它對於胃腸管、膽管、尿道等具有選擇性之強力解痙作用，但卻對其他副交感神經支配器官影響甚微。

【成份·性狀】 Each tablet contains:

Trospium chloride.....10mg

本劑係白色-微黃色帶苦味之粉末。



B-benzyloxy-6, 10-ethano-5-azoniaspiro[4,5]decane Chloride

【一般名:Trospium Chloride】

【作 用】 依文獻記載

- 1.能選擇作用於胃腸管、膽管、尿道而解除其痙攣之疼痛，並抑制其亢進之運動機能。
- 2.除緩解胃、十二指腸潰瘍之疼痛外，對抑制胃酸分泌及抗潰瘍作用亦具顯著功效。
- 3.具促進尿道結石排出之效果。
- 4.服用本劑不會產生抗藥性，故可長期安心服用。
- 5.對中樞神經無不良作用，亦無抑制心房或抗Adrenaline等作用。

【適 應 症】 平滑肌痙攣緩解及鎮痛。

【用法用量】 通常成人1回1~2錠，1日3回空腹口服，依年齡、症狀適宜增減。

本藥須由醫師處方使用。

【毒 性】 依文獻記載

1.急性毒性

		LD ₅₀ (mg/kg)			
		經口	皮下	腹腔內	靜脈內
動物	性別				
mouse (JCLICR)	♂	812	218	63	12.3
	♀	901	203	50	11.2
Rat (Wister)	♂	1,510	841	126	15.5
	♀	1,730	707	97.7	16.2

		LD ₅₀ (mg/kg)			
		經口	皮下	腹腔內	靜脈內
動物	性別				
Rabbit	♂	3,200			20
Dog	♂ ♀		160		

2.慢性毒性

對Donryu Rat分別做每日經口投與126、42及14 mg/kg劑量各連續6個月之試驗結果，除126 mg/kg投與組見有抑制體重增加現象外，與對照組比較，並無異常發生。

3.對胎兒影響

使用JCL-ICR係Mouse及Wistar係Rat，經口投與(Mouse:3、10、30及100 mg/kg日。

Rat:3、30及300 mg/kg/日)及皮下注射(Mouse:0.25、2.5及25 mg/kg/日。Rat:0.25、2.5、12.5及25 mg/kg/日)之胎兒試驗，各投與組與對照組比較均無任何異常發生。

【注意事項】 依文獻記事

(1)對下列病患勿使用：青光眼、前列腺肥大引起之排尿障礙，重症患及麻痹性ileus症。

(2)對下列病患應審慎使用：前列腺肥大症及幽門狹窄症。

(3)副作用：

- 1.眼：偶發生視調節障礙。
- 2.精神神經系：偶有嗜眠傾向，稀少有頭痛等症狀。
- 3.消化器：偶發生口渴、噁心、嘔吐感、燒心、胃部膨脹、便秘、食慾不振等症狀。
- 4.循環器：稀少發生心悸。
- 5.過敏症：稀少發疹等過敏症狀，如發生過敏症狀應即停止用藥。
- 6.泌尿器：偶會發生排尿障礙。

(4)相互作用：如與下列藥劑併用時可能強本劑之作用：三環系抗鬱劑、phenothiazines系藥劑、monoamine oxidase inhibitor(MAOI)。

(5)其他：因偶會引起視調節障礙及易眠，故服用本劑者於開車及操作機械時應加注意。

【儲存條件】 25℃以下儲存。

【包 裝】 3-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

