

“羅得” 安不嗽 錠 30公絲 (安布索)

AMBROXOL Tablets 30mg "R.T."

衛署藥製字第 033204 號

GMP G-2056

作用：

本品具有肺表面活性質分泌促進作用，氣管液分泌促進作用，線毛運動亢進作用，因此可以有效地幫助肺及支氣管粘液的排除與呼吸之通暢，本品耐受性良好，可以長期使用。

成份：每錠中含：

Ambroxol Hydrochloride..... 30mg

賦形劑：Lactose ; Potato starch ; Povidone ; Microcrystalline cellulose ; Sodium starch glycolate ; Citric acid ; Magnesium stearate.

適應症：祛痰

用法用量：

成人與6歲以上小孩：初期治療每天3次，每次30mg，長期治療每天2次，每次30mg。

2-5歲兒童，每日劑量1.2-1.6mg/kg，分3次服用。2歲以下兒童，每日劑量1.2-1.6mg/kg，分2次服用。

本藥須由醫師處方使用。

【 警語及注意事項】：

有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑 (erythema multiforme)、史帝文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症 (Stevens-Johnson syndrome < SJS > / toxic epidermal necrolysis < TEN >)、急性廣泛性發疹性膿皰症 (acute generalised exanthematous pustulosis < AGEP >) 等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含 ambroxol 或 bromhexine 成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀（如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛）。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

【 不良反應】：

免疫系統疾患：

罕見：過敏反應 (hypersensitivity reactions)

頻率未知：過敏性反應 (anaphylactic reactions)

(包括：過敏性休克、血管性水腫、癲癇症)

皮膚及皮下組織疾患：

罕見：皮疹、蕁麻疹

頻率未知：嚴重皮膚不良反應 (包括：多形性紅斑、史帝文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症)

1. 副作用

① 胃腸道：偶有胃部不快、胃痛、腹部脹滿感、下痢、噁心、嘔吐、便祕、食慾不振等現象。

② 過敏症：偶有發疹、蕁麻疹樣紅斑、搔癢感等症狀出現，停藥即可。

2. 孕婦投與：懷孕期之安全性尚未確立，孕婦投與前須先衡量其利弊得失。

貯存方法：避光、室溫保存。

包裝：4~1000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號