



廣效性抗生素製劑

AXC5-005
衛署藥製字第025866號

“永信”
安莫西林
Amoxicillin

膠囊 500毫克

Capsules 500mg
"Yung Shin"



【成分】每膠囊中含：

Amoxicillin Trihydrate 575mg
equivalent to Amoxicillin 500mg (Potency)

【賦形劑】

Lactose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Talc、Capsule #0 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Iron Oxide Yellow)。

【作用】

1. 本藥係一廣效性、殺菌性的抗生素，對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌，在低濃度下即能顯示殺菌作用。
2. 對Amoxicillin有感受性革蘭氏陽性、陰性菌株所引起之下列各種感染症：
 - a. 上呼吸道感染症：扁桃腺炎、咽喉炎、鼻竇炎、鼻蓄膿症、中耳炎、內耳炎。
 - b. 下呼吸道感染症：急、慢性支氣管炎、支氣管擴張症、肺炎、支氣管肺炎。
 - c. 泌尿生殖道感染症：前列腺炎、副睪丸炎、前庭大腺炎、子宮頸炎、子宮內膜炎、骨盤腹膜炎、膀胱炎、腎盂腎炎、淋病、尿道炎。
 - d. 胃腸道感染症：腸炎、細菌性痢疾、傷寒熱、副傷寒熱、急、慢性腸胃炎。
 - e. 皮膚及軟組織感染症：蜂窩組織炎、癰、癤、毛囊炎、膿皮症、瘰癧、褥瘡、創傷、手術後第二次感染。
 - f. 其他：敗血症、細菌性心內膜炎、乳腺炎、骨髓炎、骨膜炎、膽管炎、膽囊炎、胰腺炎、腦膜炎、齒齦膿瘍、智齒周圍炎、齒槽骨炎。
3. 本藥通常口服後30分鐘即能發揮藥效，2小時後達到最高血中濃度，且其藥效可持續6小時以上，其血中濃度為同劑量Ampicillin之2~2.5倍，而以較高的濃度分佈於喀痰、尿液、膽汁等各組織中，故對於上、下呼吸道、泌尿生殖道、腸胃道、皮膚及其他感染症方面均比Ampicillin有更佳的治療效果。
4. 本藥對於泌尿生殖道感染症的治療效果較Ampicillin好；Amoxicillin口服後有60%左右以有效型存於尿液中發揮作用，而同劑量的Ampicillin則僅有35%左右以活性型存在於尿液中。

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【用法用量】

通常成人每次250mg (Potency)，一天三次服用之；2歲以下則每次62.5mg (Potency)，2~10歲則每次125mg (Potency)，一天三次服用之（亦可為20~40mg/kg/day，分三次使用），10歲以上者同成人劑量使用。通常當病情嚴重時上述劑量可以加倍使用之。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

1. 曾對本藥產生過敏之患者禁用本藥。
2. 傳染性單核症患者。

【一般注意】

1. 使用本藥時，為防止可能發生的休克反應，宜詳細問診後投與之。
2. 本藥對於下列病患宜慎重投與之：
 - a. 曾對Penicillin類或Cephalosporin類藥物產生過敏現象者。
 - b. 本人或雙親、兄弟有易引起支氣管喘息、發疹、蕁麻疹等過敏性反應體質者。
 - c. 高度腎障害患者：宜延長投與間隔時間投與之。
3. 可能有因重複感染(Superinfection)而導致口內炎、大腸炎、念珠菌症等現象，此時宜中止投藥並行適當處置。
4. 可能會造成維他命K缺乏症狀（低Prothrombin血症，出血傾向等），或維他命B群缺乏症狀（舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎等）。對於高齡患者、衰弱患者及食慾不佳的患者更易引起此現象。
5. 其他偶而會引起Jarisch-Herxheimer反應（梅毒患者）的紅腫硬結現象。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】

1. 宜小心觀察以防止偶有之休克現象。另外若有不快感、口內異常感、喘鳴、眩暈、便秘、耳鳴等症狀出現時，宜中止投與之。
2. 發熱、發疹、蕁麻疹等過敏症狀，此時宜中止投藥。
3. 偶有嗜酸球增多、白血球減少、紅血球減少等血液障害現象出現，故若有異常時宜中止投藥。
4. 偶有SGOT、SGPT上昇等肝障害現象。
5. 偶有伴隨著發熱、腰痛、白血球增多、粘液便、血液便而產生激烈下痢，並於內視鏡檢查下有偽膜斑形成的嚴重偽膜性大腸炎發生。另外亦偶有下痢、噁心、食慾不振等症狀出現。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

3~1000粒玻璃瓶裝，塑膠瓶裝，鐵罐裝，PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅三廠：台中市大甲區日南里工六路26號

2144425

