安適胃寧液 1 毫克/毫升
Aswell Solution 1 mg/ml

GMP
 衛署藥製字第 043730 號
 G-7073

主 成 分：每毫升(ml)含有
 Metoclopramide (hydrochloride).....1.0 mg

適 應 症：
 預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

- 1.緩解胃與食道之回流：
 每日四次，飯前及睡前 30 分鐘服用 10~15 毫升，如症狀是間歇性或在某特定時間發生，則藥量一次可提高至 20 毫升，並在狀況發生前服用，可不必連續服藥。
- 2.若對本藥有過敏者，可減少至每次 5 毫升。
- 3.治療食道糜爛和潰瘍者的臨床經驗不多，故治療週期建議不要超過 12 週。
- 4.糖尿病人胃蠕動不良的緩解，每餐飯前及睡前 30 分鐘，服用 10 毫升，共 2~8 週。

藥理作用：

Metoclopramide 能刺激上胃腸道的蠕動，而不致刺激到胃、膽、胰的分泌，它主要為增加乙酰膽鹼的敏感度，進而增加胃收縮的強度及幅度，放鬆幽門括約肌和十二指腸球，增加十二指腸的蠕動和空腸，使造成加速胃的出空及腸的通暢，也可以增加下食道括約肌的收縮強度，但對結腸及膽囊的刺激影響是很小的，給病人 5~20 毫升的 Metoclopramide 即可使下食道的括約肌壓力增大。

禁 忌 症：

若增加腸胃蠕動會造成傷害者，如已患腸胃出血、阻塞或穿孔者，則不適合服用本劑，此藥亦不可用於親絡細胞瘤病人，因為可能會因瘤放出 Catecholamines 而造成高血壓危機。此藥也禁用於對此藥過敏及無耐受性的病人。Metoclopramide 也不可用於癲癇病人。

注意事項：

1. Metoclopramide 對胃腸蠕動的作用會被抗膽素激(Anticholinergic)藥和麻醉藥相拮抗，而當與鎮靜藥、酒精、安眠藥及麻醉藥合用時會發生鎮靜作用。
2. Metoclopramide 對有高血壓的病人會因釋放茶酚胺，所以用藥時要多加小心。
3. Metoclopramide 會使須經胃作吸收的藥的吸收減少(如 digoxin 等藥)，而使得在小腸吸收的藥之吸收速率及吸收量增加(如 Acetaminophen, tetracycline, levodopa, ethanol, cyclosporine 等藥)。
4. 服用 Metoclopramide 會加快食物輸送到腸及腸的吸收，使糖尿病患胰島素不及反應，造成血糖太低，故應注意胰島素用藥時間及藥量的控制。

過 量：

過量會產生思睡、缺失方向感、有錐體外反應，用抗巴金森氏症藥物或抗膽素激(Anticholinergic)藥物可改善。早產兒及足月之初生兒，如口服 1~4 ml/kg/day，會發生變性血紅素尿，可用 IV 注射 Methylene Blue(甲烯藍)解毒。

副 作 用：

1. 中樞神經的影響：偶有不安、倦睡、疲勞、乏力(疲憊)、失眠、頭痛、精神混亂、思睡等現象。
2. 錐體外的反應 - 急性的 Dystonia 反應，包括肢體不自主顫抖、顏面攣縮、斜頸、眼球震顫等副作用及巴金森氏症狀的出現。
3. 內分泌不正常：包括乳漏、停經、男性女乳化。
4. 心血管症狀：包括低血壓、高血壓、心跳徐緩等。
5. 腸胃方面反應：噁心、腸攪動、腹瀉等。
6. 腎：尿頻及不適感。

警 語：

1. 造成抑鬱。
2. 成人每天服用 30~40 ml，少數會有錐體外症狀，如手指震顫、肌僵直、斜頸及顏面攣縮症狀。
3. 有巴金森氏症的病人用藥要特別小心，因會有加重惡化的可能。
4. 此藥會影響精神及生理，故服藥後不宜操作重機械或開車。

包 裝：40~4000 毫升塑膠瓶裝

儲 存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封避光儲存於 25°C 以下，請勿冰存。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)
 CENTER LABORATORIES INC.
 地 址：臺北市松山區民權東路三段 189 號 8 樓
 晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)
 廠 址：新竹縣湖口鄉實踐路 2 號
 公司電話：(02) 2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562
 工廠電話：(03) 598-1829 圖文傳真：(03) 598-1820