

105.0 mm

200.0 mm

心臟選擇性 β_1 阻斷劑

愛平諾 膜衣錠 50 毫克 衛署藥製字第 G-7063 號
043704

愛平諾 膜衣錠 100 毫克 衛署藥製字第 G-5899 號
041497

Atinol F.C. Tablets (50mg,100mg)

[成分名] Atenolol

[劑型、含量]

膜衣錠：每錠含 Atenolol (50mg,100mg)

[臨床藥理]

Atenolol 是一種乙型腎接受體阻斷劑(β_1 -Adrenergic Receptor Blocker Agent)，具有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，可降低心率及收縮力，對減除心絞痛病人之症狀有效，對高血壓的治療亦有效。口服單一劑量其藥效可達二十四小時之久；由於劑量範圍狹窄且作用迅速，很快便可看出藥物在病人身上效果，且服藥方法簡單，易被病人接受。

[適應症]

高血壓、狹心症

[用法用量]

本藥須由醫師處方使用

1.成人：(A)高血壓：起始劑量 50mg 可單獨每日服用 1 次，或與利尿劑及其它抗高血壓治療劑同時使用，若效果不明顯則提高到一天 100mg，一般服用 1-2 星期就會有完全之療效。

(B)狹心症：起始劑量 50mg 每日 1 次，若一星期內效果不明顯則提高劑量到一天 100mg，有些病人須提高到 200mg 才能達到適當效果。

2.兒童：本藥物尚無用於兒童之經驗，故不宜使用。

3.老人：劑量也許要減低，特別是腎功能不全的病人。

[注意事項]

[禁忌]

1. 患有二度或三度心臟傳導阻斷的病人不可服用本劑。
2. 不可與 Verapamil 同時服用，若須服用 Verapamil，則須事先停止使用本劑。

[注意事項]

1. 未經治療的心臟衰竭患者，禁服本藥物，若經過治療的心臟衰竭患者，可推介本藥物，但服用後若有鬱血性心臟衰竭的情況發生時，則應暫停使用。
2. 本藥物藥理作用之一是降低心跳率，可能出現心跳緩慢現象，若發生此時可減少藥量。
3. 本藥物是有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，所以患有慢性呼吸道阻礙的病人需小心使用。因它也可能引起氣喘病人的呼吸道阻礙。

105.0 mm

200.0 mm

4. 患有心缺血病人，治療不可突然中斷，如果本藥物與 Clonidine 同時服用時，Clonidine 不宜中斷服用，須直至本藥物停止服用後數天才可停止。

5. 用於麻醉手術前，宜停用本藥物且間隔須四十八小時以上，如治療要繼續使用，麻醉劑如乙醚，Cyclopropane 及 Trichloroethylene 宜特別注意，若發生 Vagal dominance，可以用 1-2 mg(I.V.) Atropine 解除。

6. 本藥物是經由腎臟排泄，所以對嚴重腎臟機能失常的病人應依情況調整劑量。一般而言病人其 Creatinine Clearance 若為 15-35ml/min/1.73 m² 則服用劑量應為每日 50mg；若小於為 15ml/min/1.73 m² 則服用劑量應每隔一天服用 50mg。

7. 孕婦：像其它藥物，除非必要，否則最好不要服用。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：D

[過量處理]

過度心跳緩慢可用 Atropine 1-2mg 靜脈緩慢注射，若需要時，可加上乙型接受器興奮劑，如 Isoprenaline 25 μ g 或 Orciprenaline 0.5mg 靜脈緩慢注射但必須防止血壓下降太低。

[副作用]

一般的副作用是由於本身藥理作用所引起的。但極少發生。包括四肢冰冷、肌肉疲勞和心跳緩慢，至於其他乙型接受體阻斷劑常見的睡眠不寧，本藥物無此報告，很少有皮膚疹及乾眼之報告，若副作用無法加以解除則需考慮停止用藥，而停止使用是要漸進為之。

[儲存條件]

25°C 以下遮光儲存。

[賦形劑]

Magnesium Carbonate Heavy, Corn Starch, Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Stearate, HPMC 615, Glycerin, Talc, Titanium Dioxide

[包裝]

Atinol F.C. Tablets 50mg 錠
2~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
Atinol F.C. Tablets 100mg 錠
1~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

委託者：**健喬信元醫藥生技股份有限公司**

303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

製造廠：**優良化學製藥股份有限公司**

303 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號

SLT0232R-04