

"美時"
剝咳得® 軟膠囊 200毫克
Bensau® Soft Capsules 200mg "Lotus"

GMP
G-12007
衛署藥製字第 057991 號

【成 分】：

"美時"剝咳得軟膠囊 200毫克
每粒軟膠囊含Benzonatate 200mg

【藥 理】：

Bensau為一非麻醉性口服止咳劑。

Bensau對於周邊之作用乃經由麻醉呼吸道、肺部、肋膜上之牽張接受器(stretch receptor)而減弱其活性，從發源處減少咳嗽之反射。藥效開始約在服用後15~20分鐘內，作用維持約3~8小時。建議劑量下並無抑制呼吸中樞之作用。

【適應症】：

解除咳嗽症狀。

【禁忌症】：

對於benzonatate或相關化合物過敏者。

【注意事項】：

- 1.十四歲以下兒童及吞嚥困難者不得使用。
- 2.若膠囊於口中崩解，主成分之釋出會使口腔黏膜產生短暫之局部麻醉而可能有梗塞感；因此本藥不可咀嚼而需要直接吞服。
- 3.孕婦：應於必要之情況下才可投與(未有動物試驗建立其對胎兒之影響性)。
- 4.授乳婦：此藥於乳汁中的分泌情形尚未確立，給藥時仍需密切注意。
- 5.未有試驗研究其致癌、突變或對生育力之影響。

【副作用】：

曾有鎮靜、頭痛、輕微眩暈、癢感、發疹、鼻塞、便秘、噁心、腸胃不適、眼灼感、怕冷、胸悶、過敏被報告過。

【過 量】：

未有明確案例被報告。此藥之化學結構類似tetracaine及某些局部麻醉劑，也同樣會具有其藥理與毒物學方面的特性。此類藥物通常口服後吸收良好。

【中毒症狀】：

若膠囊於口中嚼碎，口咽部會快速產生麻痺感；中樞之刺激可能導致無法安靜、震顫；進一步之中樞抑制作用可能導致間歇性肌陣攣。

【中毒之處理】：

- 1.洗胃、給予活性碳，即使病人意識清醒，其咳嗽與嘔吐反射可能受抑制而須特別加護以防止病患吸入胃內容物或被投與之口服藥。
- 2.若發生痙攣則應靜脈注射短效型巴比妥鹽，須注意控制其最小有效劑量。
- 3.在嚴重中毒時之治療重點為呼吸急救措施與心血管、腎功能之醫護。
- 4.勿投與中樞刺激性藥物。

【劑 量】：

成人每日三次，每次1粒100mg或200mg膠囊，本品最大劑量為600毫克/日。

【包 裝】：

6~1000粒塑膠瓶裝。

【儲存條件】：

於陰涼室溫(25°C)下儲存。本品應存放在兒童拿取不易之處。

【保存期限】：

敬請注意遵守包裝盒上註明的保存期限。



PIC/S GMP藥廠

藥 商：美時化學製藥股份有限公司

地址：台北市復興南路一段200號11樓

製造廠：美時化學製藥股份有限公司 南投廠 地址：南投縣南投市新興里成功一路30號