


胃、十二指腸潰瘍治療劑

“強生”妙治胃益錠

BENTYLIN-S TABLETS "JOHNSON"

內衛藥製字第001780號

【化學式】β-Diethylaminoethyl 1-Cyclohexylcyclohexanecarboxylate Hydrochloride



【性狀】白色結晶性粉末，易溶於水(1：4)。
【成分】每錠含有：

Dicyclimine HCl.....	5mg
Aluminum Hydroxide Gel,Dried.....	400mg
Magnesium Oxide.....	200mg
Sodium Lauryl Sulfate.....	25mg
Methylcellulose.....	100mg
Menthol.....	1mg

【賦形劑】Hydroxypropyl Cellulose Low、Magnesium Stearate、Menthol、Methylcellulose、Saccharin Sodium、Sodium Lauryl Sulfate、Sodium Starch Glycolate、Sucrose、Sweetmint

【注意事項】1. Dicyclimine Hydrochloride

- (1)禁忌：線內障、前列腺肥大、排尿障害。
- (2)慎重投與：a.前列腺肥大患者。b.甲狀腺機能亢進、血性心不全不整脈、潰瘍性大腸炎。
- (3)副作用：a.眼：可能有視調節障害、眼內壓亢進等症狀出現。b.精神神經系：可能有頭痛、頭重、眩暈、眠氣等症狀出現。c.消化器：可能口渴、便秘、噁心、嘔吐、腹部膨滿不快感、鼓脹、食慾不振等症狀出現。d.循環器：可能有心悸亢進等症狀現象。e.過敏症：可能有發疹等過敏症狀出現。f.泌尿器：可能有排尿障害出現。g.其他：可能有倦怠感、脫力感出現。
- (4)相互作用：與其他藥劑併用(三環系抗鬱phenothiazine、Monoamine氧化酵素抑制劑)有增強本劑作用。
- (5)本劑投與中之患者開車與操作機械時需注意。

2. Dried Aluminum Hydroxide Gel.

- (1)慎重投與：酸鹽缺乏患者。
- (2)副作用：a.消化器：可能有便秘、嘔吐、噁心等症狀時則減量或停藥併用適量緩下劑。b.長期投與類似精神症狀有骨軟化症發現時須定期血液測定。c.相互作用：同時服用Tetracyclin系抗生素會阻礙其吸收。d.腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

3. Magnesium Oxide

- (1)慎重投與：a.腎障害患者。b.心機能障害患者。c.下痢患者。d.高鎂血症患者。
- (2)副作用：a.代謝異常：長期大量投與如有高鎂血症出現即減藥或停藥。b.消化器：可能有下痢症狀現象。
- (3)相互作用：a.同時併用Tetracycline系抗生素會阻礙其吸收。b.消化管內吸著作用，體液pH上昇，併用藥劑會影響其吸收排泄則須慎重投與。c.大量牛乳Calcium製劑併用如有milk-alkali syndrome出現即停止用藥。

【適應症】胃、十二指腸潰瘍、胃酸過多症、胃炎、胃痛、潰瘍性及痙攣性大腸炎。

【用法·用量】成人：通常一次1錠，1日3次，於飯前或飯後咬碎服用。本藥須由醫師處方使用。

【包裝】6~1,000錠 塑膠瓶裝。儲存於25℃以下。



Code No. : K-23

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區中和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405