

衛生福利部食品藥物管理署核定為PIC/S GMP 藥廠

正和商標



正確藥效

"正和"祛酸利膠囊 100 公絲 (本補麻隆) Benzro Capsules "C.H."

"正和"祛酸利膠囊 (Benzbromarone) 能降低血液中尿酸的濃度，促進尿酸的排泄。"正和"祛酸利膠囊能加強腎臟之尿酸排泄，並可幫助胃腸道對尿酸之清除作用。每日投與一粒 (100mg)，六~八天後可達正常尿酸代謝值。

【成分】 Each Capsule Contains :

Benzbromarone100mg

【適應症】 痛風、高尿酸血症。

【用法用量】 通常成人早餐時口服一粒 (100mg)，六~八天後可達正常尿酸代謝值。如期待快速之尿酸下降，可在早餐口服二粒 (200mg)，尿酸血中濃度恢復正常後改投與一粒 (100mg)。

本藥須由醫師處方使用。

【副作用】 通常投與"正和"祛酸利膠囊不致於有不良反應發生。很稀少的病患，偶而發生食物通過消化管速度過快之現象。如有這種訴苦，停藥則可恢復正常，或可投與一些消化管收斂藥劑。

【禁忌】

1. 對本藥過敏者。
2. 嚴重肝功能不良。
3. 嚴重腎功能不良。
4. 尿酸性腎臟結石。
5. 懷孕及可能懷孕的婦女。

【警語】

1. 猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
2. 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。
3. 在使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝臟疾病。並應告知病人使用本藥可能有肝臟疾病的副作用，如出現食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。

【注意事項】

1. 開始投與本藥品前應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。
2. 腎功能異常之患者，建議酌予減量。
3. 重度肝功能異常之患者，應小心使用。

附註：為求快速制止痛風之發作，在初治療時的第一天可用"正和"祛酸利膠囊及 Colchicine 合併投與。尿之鹼性化及充分之利尿，能加強尿酸之排泄，特別是對於患有腎臟結石之病患，是故尿之鹼性化及促進利尿之補助療法是很重要的。

【貯存】 儲存於 25°C 以下。

【包裝】 2~1000 顆塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

【賦形劑】

◎膠囊內容物：Sodium Lauryl Sulfate、Sodium Benzoate、Lactose Monohydrate。

◎膠囊殼：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Sunset Yellow FCF、Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Titanium Dioxide。

衛署藥製字第 040174 號

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路 23 號(新營工業區)