

"安星" 複方鴉片甘草合劑錠
Opium and Glycyrrhiza Mixture Tablets "Astar"

[主 成 分] 每錠含有

Opium Powder (阿片粉).....2.5 mg
Glycyrrhiza Fluid Extract (甘草流浸膏).....0.48 ml
Antimony Potassium Tartrate (酒石酸銻鉀).....1.0 mg

[賦 形 劑]

Benzoic Acid、Potato Starch、Lactose、Camphor、Anise Oil、Magnesium Stearate、Talc。

[適 應 症]

鎮咳、祛痰。

[用法用量]

本藥須由醫師處方使用。

成人：每次2~3錠，一日3次，視病況酌予增減。

[注意事項]

- 1.具成癮性，須慎重給藥勿超過建議劑量。
- 2.不得併服含酒精飲料。
- 3.服後偶有思睡、眩暈現象，應避免開車及操作機械。
- 4.發疹、搔癢、過敏時，應即停藥。

[禁 忌]

嚴重呼吸抑制的病患禁用、嚴重肝機能障礙、心機不全的患者、急性酒精中毒患者均禁用。

孕婦及哺乳婦：

在相關性的動物試驗報告中指出會產生畸形胎，且會經由母乳而引起新生兒呼吸抑制，一般不建議給藥，除非醫療上必要。

[副 作 用]

呼吸抑制、不整脈、血壓異常、思睡、不安、眩暈、興奮、發汗、視覺模糊，噁心、嘔吐、便秘等現象。

[包 裝]

12~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

[貯 存]

- 1.本品應置於孩童伸手不及之處。
- 2.使用前或後均請密封30°C以下避光貯存。

安星製藥股份有限公司
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號