

“南光”

撲炎喜[®]

腸溶膜衣錠

Broen-C[®] Enteric F.C. Tablets “N.K.”

■ 成分：Each Tab. contains:
Bromelain.....20000 units
L-Cysteine.....20 mg

■ 賦形劑：

Lactose Monohydrate、Povidone、
Sodium Starch Glycolate、
Magnesium Stearate、
Hypromellose Phthalate、Polyethylene
Glycol 6000、Hydroxypropyl
Methylcellulose、Titanium Dioxide、
Ferric Oxide Hydrate。 1

■ 作用特徵：

1. 具有強力抗炎效果：撲炎喜經口投與由腸管吸收後，迅速地使不活性的 Plasminogen 變成能使 Fibrin 分解的 Plasmin，故可消除因 Fibrin 的積聚所產生的體液循環障礙而引起的浮腫、腫脹、疼痛及發赤等現象，另一方面能使血清產生 Protease 的抑制因子，以抑制 Protease 的過度活性，消除因 Polypeptide 積聚所引起之炎症現象。
2. 不影響血液的凝固時間：撲炎喜對於引起炎症的 Fibrin 具有選擇性的溶解效果，而對於血液凝固所必須

的 Fibrinogen 沒有作用，故不影響血液的凝固時間。

3. 分解壞死細胞，促進組織新生，縮短治療時間：能將壞死細胞分解而淨化病巢面之變性物，使淋巴液再吸收，正化細胞之代謝作用，故可助長組織新生，促進治癒速度。
4. 具有溶痰及化膿作用：對濃密的膠粘分泌物溶解，並泡化，使痰容易咯出，減輕咳嗽，改善肺部換氣，並使膿容易排出。
5. 不會引起過敏症狀：本劑係經口投與，故不致引起血液、凝固、血壓下降、呼吸困難等副作用。
6. 服用簡便，安全投與量增減容易，



內有說明書請由此打開

【適應症】

手術後及外傷後腫脹之緩解、副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴喀痰咯出困難、氣管內麻醉後之喀痰咯出困難、痔核。

【用法用量】

1日3~6錠，3~4回分服。

依年齡及症狀增減。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】詳情請閱說明書。

衛署藥製字第039239號

且不為胃分解而影響藥效。

■ 適應症：

手術後及外傷後腫脹之緩解、副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴喀痰咯出困難、氣管內麻醉後之喀痰咯出困難、痔核。

■ 用法用量：

1日3~6錠，3~4回分服，依年齡及症狀增減。本藥須由醫師處方使用。

■ 注意事項：

1. 遇有消化器官潰瘍，重症的肝、腎機能障礙或血液

凝固機能不全時，不可使用本劑。

2. 伴有感染症者宜併用適當抗生素或化學療法劑。
3. 本劑宜吞服，不可嚼碎。

■ 包裝：

6-1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

■ 儲存：

請於室溫25℃以下陰涼處貯存。

■ 許可字號：

衛署藥製字第039239號



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845

“南光”

撲炎喜[®]

腸溶膜衣錠

Broen-C[®]



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845

123114-01 2601000000141

1000粒裝

【成分】

Each Tab. contains:
Bromelain...20000 units
L-Cysteine.....20 mg



4 715718 141056