

碳酸鈣錠

Calcium Carbonate Tablets 500mg “Yihhaw”

本品為一口服碳酸鹽結合劑，取代含鋁制酸劑，對尿毒症患者可避免造成鋁中毒之副作用，亦可降低血磷以避免副甲狀腺功能亢進。

【劑型、含量】錠劑，每粒含：

主成分：Calcium Carbonate.....500mg

賦形劑：Corn Starch、Lactose、Mannitol、Avicel、Saccharin Sodium、Polyvinyl Pyrrolidone、Tartrazine、Orange Powder、Magnesium Stearate

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

單次劑量(1錠)之酸中和能力為 9mEq。

【用法用量】

一天 3 至 4 次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一. 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

- 一. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 1. 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 2. 本藥每日最大建議量之含鎂量超過 50mEq(0.6g)，腎疾患者不要服用。
 3. 本藥每日最大建議劑量之含鈉量超過 5mEq(0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
 4. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 5. 制酸劑不得併用其他藥品。
- 二. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四. 本藥含鈣之制酸成分，可能引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- 五. 本藥含碳酸鹽之制酸成分，可能引起腹脹，打嗝。

【包裝】6-1000 錠鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。

【儲存】請放置於兒童取用不到的地方，室溫（15-30℃）避光儲存。

衛署藥製字第 034537 號

製造廠：利達製藥股份有限公司

廠址：台中市大甲區中山路一段 906 號

電話：04-26872345

委託者：鎰浩貿易股份有限公司

地址：台北市松山區南京東路五段 222 號 4 樓

電話：02-2764805

碳酸鈣錠

Calcium Carbonate Tablets 500mg “Yihhaw”

本品為一口服碳酸鹽結合劑，取代含鋁制酸劑，對尿毒症患者可避免造成鋁中毒之副作用，亦可降低血磷以避免副甲狀腺功能亢進。

【劑型、含量】錠劑，每粒含：

主成分：Calcium Carbonate.....500mg

賦形劑：Corn Starch、Lactose、Mannitol、Avicel、Saccharin Sodium、Polyvinyl Pyrrolidone、Tartrazine、Orange Powder、Magnesium Stearate

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

單次劑量(1錠)之酸中和能力為 9mEq。

【用法用量】

一天 3 至 4 次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一. 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

- 一. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 1. 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 2. 本藥每日最大建議量之含鎂量超過 50mEq(0.6g)，腎疾患者不要服用。
 3. 本藥每日最大建議劑量之含鈉量超過 5mEq(0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
 4. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 5. 制酸劑不得併用其他藥品。
- 二. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四. 本藥含鈣之制酸成分，可能引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- 五. 本藥含碳酸鹽之制酸成分，可能引起腹脹，打嗝。

【包裝】6-1000 錠鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。

【儲存】請放置於兒童取用不到的地方，室溫（15-30℃）避光儲存。

衛署藥製字第 034537 號

製造廠：利達製藥股份有限公司

廠址：台中市大甲區中山路一段 906 號

電話：04-26872345

委託者：鎰浩貿易股份有限公司

地址：台北市松山區南京東路五段 222 號 4 樓

電話：02-27648055