



非麻醉性鎮痛劑

CPT-004  
衛署藥製字第26272號

**痛定**<sup>®</sup>  
(尼夫平)

膜衣錠 30毫克

**Capain**<sup>®</sup>  
(Nefopam)

Film Coated Tablets 30mg

2.9cm

在臨床藥理學方面，長期追尋一種具有獨特鎮痛藥效作用，能確實解除各種原因所引起的疼痛，而沒有呼吸抑制作用和其它副作用及潛伏的成癮性或依賴性的理想鎮痛劑。本藥就是符合此種迫切需要而研製成功，不同於一般止痛劑的非麻醉性鎮痛劑。

**【成 名】** 每錠中含：  
Nefopam Hydrochloride.....30mg

**【賦 形 劑】**  
Sodium Starch Glycolate、Sodium Lauryl Sulfate、Magnesium Aluminosilicate、Aluminum Magnesium Silicate(UFL2)、Hydroxypropyl Cellulose、Talc、Magnesium Stearate、Hydromellose、Dimethicone、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、Titanium Dioxide。

**【特 徵】**  
1. 本藥為作用於中樞神經之鎮痛劑，雖然作用機轉未明，但是臨床上對於各種原因所產生的劇痛，均有止痛療效。  
2. 本藥鎮痛效果確實，對各種程度之疼痛由Aspirin以至於Morphine皆有效。鎮痛程度與劑量有關，且不會有Morphine樣副作用，不引起呼吸抑制。  
3. 本藥與其它各種止痛劑無關，且非麻醉性，故其使用後並無鎮靜性，習慣性或成癮性。

**【適 應 症】**  
鎮痛。

**【用法·用量】**  
通常成人每次1~2錠，一天三次經口投與之。  
本藥須由醫師處方使用。

**【禁 忌 症】**  
1. 對曾患有暈厥症病歷之患者。  
2. 不能使用於心肌梗塞之患者。

**【警 告】**  
1. 妊娠期：雖在動物試驗尚未發現畸形胎，但本劑如其他藥一樣，於妊娠前三個月內使用時宜謹慎；人類哺乳期使用本劑之資料尚缺乏，故使用時宜小心衡量其優點以及對母子所可能造成之損害。  
2. 兒童：十二歲以下兒童之安全性和療效，尚未確立。

**【注 意】**  
1. 如使用於患有青光眼、尿滯留或肝功能及腎功能障礙的患者，須慎重投與。  
2. 對正使用MONOAMINE OXIDASE抑制劑的患者，不宜使用。

**【副 作 用】**  
1. 一般常見之副作用為噁心、頭暈倦睡口乾，次為盜汗、神經過敏、失眠、嘔吐。  
2. 使用注射劑型時，注射部位會有疼痛感。

**【過 量】**  
目前尚無使用過量之報告，故並無特殊解法，倘有過量發生時，宜採用支持療法，包括洗胃、使吐、利尿。

**【保存上之注意】**  
1. 本藥應置於小兒伸手不及處。  
2. 於25°C以下、避光儲存。  
3. 請在有效期限內使用。

**【包 裝】**  
6~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2144468