

# 蓋抹滅顆粒劑

## NORIT CARBOMIX Granules for Suspension

醫師藥師藥劑生指示藥品  
衛署藥輸字第 021549 號

### 成份

有效成分及含量：每瓶含 50 公克活性碳。  
其他成分（賦形劑）：檸檬酸、甘油及阿拉伯膠。

### 用途（適應症）

緊急治療藥物或化學品中毒之病人。

#### 使用上注意事項

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 服用避孕藥的人。
  2. 服用口服藥劑的人。
  3. 服用過量氰化物、鐵鹽、鋰鹽、甲醇、乙醇和乙二醇的人。
- 三、其他使用上注意事項：
  1. 發生中毒時先使用蓋抹滅顆粒劑後，立即送醫急救。
  2. 服用蓋抹滅顆粒劑會造成黑便。
  3. 本品對腐蝕性物質引起之中毒無效，因此，如確定是由腐蝕性物質引起之中毒，應避免使用本品。
  4. 懷孕及哺乳：本品對胎兒或幼兒不會造成任何影響。
  5. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  6. 避免陽光直射。
  7. 勿超過建議使用量。

### 用法用量

瓶裝蓋抹滅顆粒劑，加入蒸餾水到標籤上之紅色線（50 公克瓶裝約加 400 毫升）後徹底搖勻。均勻混合之懸浮液，可廣泛用以吸附引起口服中毒之各種毒性物質。

成人及 12 歲以上	急性中毒時，儘快使用 50-100 公克之活性碳（1-2 瓶）懸浮液。嚴重中毒時，服用初劑量後，每 4 至 6 小時應再服用 20 公克活性碳（20 公克活性碳約為瓶裝 160 毫升之懸浮液），連續數天。對昏迷不醒的患者，在醫師或護士監督下，可經由鼻胃管給予懸浮液，瓶裝包裝附有接管供使用。蓋抹滅顆粒劑可在嘔吐或洗胃後使用。
12 歲以下	活性碳用在小孩之推薦劑量是每公斤體重給予 1 公克之活性碳。急性中毒時，依小孩之體重和中毒之程度給予 10 公克至 50 公克；幼兒初劑量給予 10 公克至 20 公克，數分鐘後根據醫師指示，可重複給藥；較大的小孩則儘量給予大劑量（30 公克至 50 公克）。治療腹瀉，只要小劑量即可。

#### 警語

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
腸胃系統	便秘、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。
2. 自覺狀況沒有改善或惡化。

### 包裝

1000 公克以下塑膠瓶裝。

### 儲存

請存放於原包裝內以避免濕氣。加水後均勻混合之懸浮液，請存放於 2-8°C。

【製造廠】 Cabot Norit Nederland B.V. (Pharmaceuticals Department)

【廠址】 Mr. Ovingkanaal O.Z. 3, 7891 EV Klazienaveen, The Netherlands.

【次級包裝廠（放置仿單）】 科懋生物科技股份有限公司

【廠址】 新北市汐止區大同路一段 120, 122, 126 號 6 樓

【藥商】 科懋生物科技股份有限公司

【地址】 台北市南港區 (115) 園區街 3 號 14 樓之 6

【電話】 (02)2655-7568