

促 進 排 卵 劑
"元宙" 樂妊芬 膠囊50毫克(可洛米分)

Clomiphene Capsules 50 mg "Y. C."

衛署藥製字第 024841 號

【成 份】Each capsule contains:

Clomiphene citrate 50 mg

【作 用】本品能刺激腦下垂體前葉之性腺刺激荷爾蒙，使其分泌增加，亦即能促進卵泡之發育，黃體態持久，同時亦管制及調節體內之動情素值，使其保持正常分量，及促進女性排卵作用。

【適 應 症】促進排卵。

【用法用量】為促進排卵，自月經開始後第5天起，1天1次服用50 mg，連續服用5天(每5天一為治療期)後，如無排卵現象，第二個月可將劑量增加至1天1次服用100 mg，再連續服用一治療期，用法與第一個月同。如仍無排卵現象，於第三個月再連續服一治療期，其用法及用量與第二個月相同。本品服用以三個治療期為限，不得超過。
本藥須由醫師處方使用。

【副 作 用】大量長期連用，顏面潮紅、卵巢肥大、腹部膨滿感、視力障礙、噁心嘔吐。如用量為100 mg，連服5天(即正確用量)則幾無上述副作用。

【注 意】(一)動物實驗確證對胎兒具有毒性及催畸形作用，雖對人體之妊娠安全性尚未確立，無可置疑的在懷孕中絕對不可服用，但為避免妊娠初期的不注意而誤服，宜注意下列各點：

①在投藥前至少1個月及治療期間測量基礎體溫並記錄之，觀察排卵誘發之有無。

②對於無月經患者，在投與前做gestagen test，消退性出血始日為第1天之第5天，又投與前有自然出血(無排卵週期症)者其第5天開始給藥。

③投藥後，基礎體溫層時應停藥。

(二)本療法之對象僅為間腦或下垂體前葉之機能障礙所致之性腺刺激荷爾蒙低分泌無排卵患者，因此下述患者不可使用：

①原發性卵巢不全所致尿中性腺刺激荷爾蒙分泌過高時。

②副腎及甲狀腺機能異常所致之無排卵患者。

③頭蓋內病變(下垂體腫瘍等)患者。

④無排卵症以外之不孕症患者。

(三)為避免本療法對卵巢過度刺激所致之副作用，需在投與前及治療期間中每天內診，特別留意以下各點，如認有異常時，應即停藥：

①患者自覺症狀(尤其是下腹部痛)的有無。

②卵巢有無腫大。

③基礎體溫有無異常上昇(每天測定)。

④頸管粘液量及其性狀。

(四)卵巢過度刺激的結果，有多胎妊娠之可能性，需將此事預先告知患者。

(五)通常反覆投與3週期亦未見排卵性月經者，停止服用。

(六)禁忌症：

①非以卵巢腫瘍及多囊胞性卵巢症候群為原因之卵巢腫大患者。

②有肝臟障礙、肝炎患。

(七)不希望有孩子的無排卵患者，原則上勿用。

(八)本品需在婦產科、內分泌專門醫師指導下使用。

【副 作 用】③卵巢過度刺激：若有下腹部疼痛，卵巢腫大時應停止使用。

④眼睛：若視力變得模糊時應停止用藥，使接受眼科檢查。

⑤過敏現象：發疹時應停止使用。

⑥肝臟：有5%以上的BSP排出遲延現象。

⑦胃腸：噁心、嘔吐、食慾不振等現象。

⑧精神神經系：頭痛、情緒不安等現象。

⑨其他：顏面潮紅、尿量增加、口渴、倦怠感。

【賦 形 劑】Starch (anhydrous)、Lactose monohydrate、Magnesium stearate、Capsule: (Gelatin、Glycerine、Sodium lauryl sulfate、New coccin、Erythrosine、Tartrazine、Titanium dioxide、Purified water)。

【包 裝】2-1000粒塑膠瓶裝。

【保存條件】於25°C以下陰涼處，避開陽光儲存。



元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路272號
T E L : (0 4 9) 2 2 5 3 1 9 0