

Colin Colin Colin

咳利寧液 Colin Solution

生達咳利寧液含有抗組織胺，可以緩解過敏症狀。本品由含鎮咳作用之生藥及西藥配製而成，為鎮咳祛痰之用藥。

【成分】

有效成分及含量：每ml含有：

Chlorpheniramine Maleate.....0.4mg

Platycodon Fl. Extract.....0.012ml

Polygala Fl. Extract.....0.012ml

其他成分（賦形劑）：

Dehydroacetate Sodium、Citric Acid Anhydrous、Sodium Bicarbonate、Menthol、Álcohol 95%、Caramel、Sucrose、Cochineal Red A、Strawberry Oil、Water Purified、Glycyrrhiza Extract (Licorice Extract)、Antifoam、Potassium Sorbate

【用途（適應症）】

鎮咳、祛痰（由支氣管炎、咽喉頭炎等所引起之咳嗽及喀痰）。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用。

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

(二)有青光眼的人。

(三)有前列腺肥大引起排尿困難的人。

二、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)如與中樞神經抑制藥品、單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) 併用或攝取酒精時，會增強抗膽鹼(Anticholinergic)作用，故應諮詢後小心投藥或減量。

三、其他使用上注意事項

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)使用前需振搖均勻，並使用所附量器量取藥量。

(五)使用本藥會引起睡意，所以服用時應注意不可駕車或從事具危險性之機械操作工作。

【用法用量】

年齡	每日用量
成人及13歲以上	一次5毫升，每日3-4次。
6-12歲	適用成人劑量之 1/2(一次2.5毫升)。
未滿6歲	請洽醫師診治

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹
泌尿系統	多尿、排尿困難
精神、神經系統	神經過敏、頭痛、焦躁感、複視、嗜睡
消化系統	口渴、胸悶
血液	血小板減少、無顆粒球症、再生不良貧血

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

【包裝】

30-4000毫升塑膠瓶裝

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯存】

請貯存於25°C以下乾燥處。

衛署藥製字第031011號

Code No.LC-06 3214070



藥商：PIC/S GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司
台南市新營區土庫里土庫6之20號

製造廠：PIC/S GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司二廠
台南市新營區開元路154號