

“榮民”

治鼻敏錠 4 毫克

Chlorpheniramine Maleate Tablets “VPP”

衛署藥製字第 003442 號

本藥為抗組織胺劑，能緩解過敏症狀。

【成分】

有效成分及含量

每錠含有 Chlorpheniramine Maleate..... 4 mg

其他成分(賦形劑)

Calcium Phosphate Dibasic, Sodium Starch Glycolate, Starch, Talc, Magnesium Stearate.

【用途(適應症)】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【使用上注意事項】

- 一、 有下列情形者，請勿使用：
 - (一) 曾因本藥成分引起過敏。
- 二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 6 歲以下。
 - (二) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
 - (三) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎臟病。
 - (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難；及青光眼的人，因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- 三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二) 65 歲以上。
 - (三) 接受醫師治療並服用藥品的人。
 - (四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
 - (五) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
 - (六) 服用本藥若有不了解之處。
 - (七) 本人或家族具過敏體質者。
- 四、 其他使用上注意事項：
 - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二) 避免陽光直射。
 - (三) 勿超過建議使用量。
 - (四) 不得與酒精性飲料併用。
 - (五) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

抗過敏	成人及 12 歲以上	一日 3 至 4 次，每次 1 錠。 每次間隔 4 小時以上服用。
	6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
	6 歲以下	請洽醫師診治。
預防暈車、 暈船、暈機	成人及 12 歲以上	於搭乘前 30~60 分鐘服用之，1 次 1 錠。 必要時，可於持續搭乘交通工具或症狀出現時再行服用。每次間隔時間應在 8 小時以上，24 小時內不可超過 3 次。
	6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
	6 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
神經系統	思睡、倦怠感、興奮。
皮膚	發疹、發紅、癢疹。
其他	頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢、視覺上之困擾。

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

6 - 1000 錠以下塑膠瓶裝。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存條件】

本藥應保持容器緊密，貯於 25°C 以下乾燥處所。



榮民製藥股份有限公司

Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.

447 Chung Shan E. Rd., Sec. 3, Chung-Li Dist., Taoyuan City, Taiwan, R. O. C.

桃園市中壢區中山東路三段 447 號 電話：(03)4651190

