



# "國嘉"喜普液

0.4毫克/毫升(鹽酸塞浦希他啉)

## Cyproh Solution 0.4mg/ml "Kojar" (Cyproheptadine Hydrochloride)

本品是一種具抗乙醯膽鹼和鎮靜作用之內服液劑，可加強抗組織胺和Serotonin-antagonist的作用，並有antimuscarinic和鈣離子阻斷效果，對一般之過敏反應，有緩解之療效。

### 【成份】本品每mL含：

Cyproheptadine Hydrochloride.....0.4mg

### 【賦形劑】

Alanine DL-、Saccharin Soluble、Sucrose、Ethanol、Methyl Parahydroxybenzoate、Propylparaben、Passion Fruit Essence、Sunset Yellow No.5 Aluminum Lake FCF、Propylene Glycol、Purified Water。

### 【適應症】

皮膚疾患引起之搔癢(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應)枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒上氣管炎引起之咳嗽、鼻涕。

### 【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

兒童：服用量通常以0.25mg/kg/day計算。2~6歲，每日服用2~3次，每次1茶匙(5c.c)，最大容許量每日勿超過12mg。7~14歲，每日服用2~3次，每次2茶匙(10c.c)，最大容許量每日勿超過16mg。

成人：服用量通常以0.5mg/kg/day計算。治療程序通常是4~20mg/day，大多數人的範圍在12~16mg/day偶爾因緩和病情可增至32mg/day。建議初使用者每次2茶匙(10c.c)，待適應後可依規定服用。

### 【禁忌症】

1. 新生兒、早產兒、授乳之母親。
2. 對Cyproheptadine或MAOI敏感者。
3. 青光眼、前列腺肥、幽門狹窄、氣喘、年老虛弱之病人。

### 【注意事項】

1. 2歲以下孩童或虛弱之老年人，最好不要服用本品。
2. 小孩或嬰兒服用過量，會造成嗜睡、中樞神經抑制、痙攣、和死亡。
3. 老年人服用本品容易造成眩暈、鎮靜和低血壓，應注意。
4. 服用本品後，應避免操作機械或開車。

### 【交互作用】

1. 和酒精或中樞神經抑制劑併用具有相加作用。
2. MAO inhibitors會延長和加強本品抗乙醯膽鹼效果。

### 【副作用】

1. 精神神經系：嗜眠、倦怠感、頭痛、眩暈、興奮、錯亂。
2. 消化器：口渴、噁心、下痢、腹痛。
3. 過敏症：發疹、水腫、蕁麻疹、對光敏感。
4. 血液：紫斑、血小板減少、白血球減少。
5. 其他：頻尿。

### 【包裝】

20~4000ml玻璃瓶、塑膠罐裝。

### 【儲存】

室溫避光保存(25°C)。



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠  
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號  
服務專線：(04)26816197