

"瑞安" 祛喘 (可多替芬) 膠囊 1 公絲

"PURZER" DEFEN (Ketotifen) Capsule 1mg

衛署藥製字第 034358 號 G-2528 號

本劑主含 Ketotifen，是一種具有特殊的抗過敏作用 (Anti-allergic Action) 與抗組織作用。本劑具有下列特殊的抗過敏之藥理作用：

- (1) 能抑制由血小板活化因子 (PAF, Platelet Activating Factor) 所引起的急性支氣管收縮反應及 PAF 所造成氣管過度反應。
- (2) 能抑制由 PAF 所引起嗜伊紅血球 (Eosinophil) 在氣管的聚積。
- (3) 能抑制化學介質 (Chemical Mediator) 如組織胺 (Histamine) 與 SRS-A 的釋放。
- (4) 能拮抗由 SRS-A 所引起的急性支氣管收縮反應。
- (5) 可預防及糾正 Isoprenaline 的減效反應 (Tachyphylaxis)。
- (6) 長期服用本劑，可顯著降低支氣管對乙醯膽鹼 (Acetylcholine) 的過度反應。

此外，本劑亦具強效及持續性的 H1-接受體阻斷作用 (H1-Receptor Blocking Activity)。

口服本劑的吸收完整，約經 2~4 小時即可達到最高血中濃度，在人體內代謝後大部份以代謝物由尿液中排出體外。

「成份」：每一膠囊含

Ketotifen (as Fumarate) 1mg

「適應症」：

支氣管性氣喘、變態反應性支氣管炎、乾草熱引起之哮喘、變態反應性鼻炎、變態反應性皮膚反應。

「用法與用量」：

成人：每天 2 次，每次 1 粒，早晚用餐時服用，對於鎮靜作用比較敏感的成人，宜採漸進方式服用本劑，即先每天 1 次，於睡前服用 1 粒，連續服用 3 至 4 天後，再增加劑量至每天 2 次，每

次 1 粒。

6 個月至 3 歲孩童：每天 2 次，每次半粒 (0.5mg)。

3 足歲或 3 足歲以上孩童：每天 2 次，每次 1 粒，早晚用餐時服用。

「禁忌」：

對 Ketotifen 有過敏病史者禁用本劑。

「注意事項」：

1. 孕婦及腎或肝功能受損的患者宜小心使用本劑。
2. 除非在醫師的照料下，否則不宜突然停止本劑的治療，以免加劇氣喘狀況。
3. 本劑與安眠藥、鎮靜劑、抗組織胺製劑，或酒精併用時，會增強效果，小心使用。
4. 本品應放置在孩童無法取得的地方。

「副作用」：

本劑極為安全，副作用極為罕見，偶有鎮靜、倦睡、口渴、眩暈、眼球震顫，或定向感障礙的情況發生。

本劑須由醫師處方使用

「包裝」：

1,000 粒以下鋁箔盒裝；及 1,000 粒以下瓶裝。

「貯存」：

本品應於室溫下避光貯存。

製造商：瑞安大藥廠股份有限公司

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

桃園縣觀音鄉觀音工業區大同一路 26 號

電話：(03)483-9641~3

經銷商：普澤藥品有限公司

台北市民族西路 225 巷 7 弄 4 號 7 樓

電話：080-221308