

尺寸：130mm\*190mm

衛署藥製字第 046351號  
GMP G-8330

"明德" **立消樂錠**  
**DIMOTIL REPE** Tablets "MEIDER"

- 【成份】每錠含：Pancreatin 212.5 mg 相當於 (Amylase 6500 Units、Lipase 8000 Units、Protease 450 Units 依據 F. I. P.) Metoclopramide Monohydrochloride 5 mg。
- 【說明】Dimotil可解除由胃腸運動及胰外分泌活性發生障礙，引起的胃腸症狀，如：腹脹感、噯氣、噁心、及胃部的緊張和壓迫感，Metoclopramide Monohydrochloride，可正常化胃及小腸的運動且可促進胃的排空，Pancreatin 則可替代或補充胰、酶的不足，促進食物的利用和吸收。
- 【適應症】消化器機能異常（噁心、嘔吐、腹部膨滿感）。
- 【用法用量】一天三次，每次一至二錠，餐時服用。
- 【類別】本藥須由醫師處方使用。
- 【警語】（依文獻記載）  
使用含 metoclopramide 成分藥品可能造成遲發性運動障礙 ( tardive dyskinesia )，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量 ( total cumulative dose ) 有正相關性，且分析本品之使用型態，約20%病人使用超過12週，故不建議長期（超過12週）使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生 tardive dyskinesia 之風險者。  
授予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用 metoclopramide 藥品相關的不良反應如肌張力失調 ( dystonias ) 及錐體外路徑反應 ( extrapyramidal reactions )，於小兒族群比起成人更容易發生。
- 【禁忌症】（依文獻記載）  
由於可能引起運動不能的症狀，Dimotil 在給予14歲以下的小孩，特別是年紀較輕的小孩，必須嚴格的指示。
- 【副作用】（依文獻記載）  
個別的情形－發生在小孩的較為顯著－ Metoclopramide 可能引起運動困難的症狀（錐體外效應，如頭、頸和肩等部位肌肉的痙攣、動眼危象）如有這種情形必須停止 Dimotil 的治療，靜脈注射 Caffeine 或 biperiden ( Akineton ) 可以迅速的除去痙攣，如停止治療，痙攣在數小時內即消失，鎮靜劑如 diazepam ( Valium ) 亦可使用，在較高的劑量下偶而有輕微的嗜眠及煩躁不安、溢乳現象。
- 【與其他藥物的作用】Dimotil 不能與神經方面藥物一起使用，因其容易導致錐體外症狀的發生。解痙藥也可能減低 Paspertin 的效果。
- 【包裝】6 ~ 1000 錠塑膠瓶及鋁箔盒裝。
- 【儲存】25°C 以下儲存。
- 【賦形劑】Lactose Granule、Hydroxypropyl Methylcellulose、Titanium Dioxide、Magnesium Stearate、Polyethylene Glycol 6000、Talc



明德製藥股份有限公司  
桃園市楊梅區民富路二段360號

MADE IN TAIWAN

20241508