



“永信”

多喜黴素

(去氧羰四環素)

Doxymycin

(Doxycycline)

DOCp-004
衛署藥製字第035692號
Code No.:32008

腸溶膠囊 100公絲

Enteric Coated Capsules 100mg
"Yung Shin"

3.98cm

多喜黴素係一種半合成四環素類抗生素，其具有與四環素類相同的抗菌譜，但其抗菌力則比一般四環素類強，血中濃度高，半衰期又長，且具有持久的抗菌效能，每日僅服藥一次即可獲得比其它每日需服用多次的四環素藥物較為優越的治療效果。

【成分】 每膠囊中含：
Doxycycline (as Hydrochloride).....100mg(potency)

【賦形劑】
Sugar Starch、Polyvinylpyrrolidone、Hydroxypropylmethyl cellulose Phthalate、Triacetin、Titanium Dioxide、Tartrazine Aluminium Lake、Talc、Capsule #2 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF)。

【特徵】
1. 本藥為一腸溶微粒膠囊，在膠囊中的每一微粒均為腸溶劑型，可確保藥品安全的通過胃，而到達小腸才崩散，故可確保胃部不受藥品刺激。
2. 本藥主要的抗菌作用為抑制細菌蛋白質之合成，對多數的革蘭氏陽性及陰性菌均有效。
3. 本藥經口服用後，可迅速且完全的吸收，同時與食物併服而不影響其作用，且由於完全的吸收而減低了一般抗生素所易造成的副作用一下痢。
4. 本藥對組織親和性強，在感染處及組織內的濃度甚高。更由於其半衰期長達22小時，而更具持久的抗菌作用，一天一次的單劑量即可獲得長達24小時的抗菌效果，且對上、下呼吸道，皮膚及結締組織，泌尿生殖系統均有優異的臨床治療效果。
5. 本藥對腎臟機能不全的病人，具有相當高的安全性，無積蓄作用，無促進氮質血症的形成，故也適用於高血壓病人，老年病人及糖尿病等各種慢性疾病的患者。

【適應症】
革蘭氏陽性菌、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

【用法·用量】
通常成人開始治療的第一天服用2粒，此後每天服用1粒（首日之2粒可一次服用，也可分成二次，每隔12小時服用一次），若用以治療嚴重的病例時亦可使用每日2粒之劑量直到痊癒為止。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】
1. 本藥口服時可能會影響肝、腎功能，故在使用本藥前及使用期間內應作肝腎機能及血尿酸素之檢查(Blood Urea Nitrogen determination)，在發現對肝腎有副作用發生時，當即停止使用或給予適當治療，則可恢復正常。
2. 發現有過敏現象時應即停止使用。
3. 治療期間同時觀察有否促成抗生素通有之無感受性菌之生長（尤以白色念珠菌之感染），如發現則應停止使用並給予適當治療。
4. 本藥禁用於已知對四環素類生物質有過敏反應者。
5. 光敏感(Photo-allergy)的病人在本藥治療期間應避免日光直射，如發現皮膚不適，則應立即停藥。
6. 使用本藥偶有噁心、嘔吐、腹瀉、陰道炎、皮膚炎、舌炎、胃炎、直腸炎發生。
7. 治療應繼續至徵候及熱度消失為止，並應注意停用本藥後，其有效抗菌力仍可維持24~36小時。
8. 氫氧化鋁凝膠(Aluminum Hydroxide gel)可減低本藥之吸收，故禁忌同時使用。
9. 多喜黴素腸溶膠囊宜整粒吞服，不宜研磨或咬碎，以免破壞腸溶性，在胃中崩解而刺激胃部；牛奶或制酸劑可能溶解腸衣膜，故不宜同時使用。

【保存上之注意】
1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】
4~1000粒罐、塑膠瓶、玻璃瓶、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2147017