

仿單

"元宙" **益利鈣錠 500 毫克**

Elica Tablets 500 mg "Y.C."

衛署藥製字第 037572 號

GMP G-4170

【成 分】

Each tablet contains :

Calcium Carbonate 500 mg

【適 應 症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【用法用量】

一天 3 次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次 2 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/2 錠；3 歲以下之嬰幼兒請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示用藥。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食，請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警 語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 - (2) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (3) 制酸劑不得併用其他藥品。
2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
4. 本藥含鈣之制酸成分，可能引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
5. 本藥含碳酸鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

【賦 形 劑】

Microcrystalline Cellulose (Avicel-101)、Pregelatinized Starch、Sodium Starch Glycolate、Tartrazine Aluminum Lake、Magnesium Stearate。

【儲 存】

於 25°C 以下儲存。

【包 裝】

12-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

元宙化學製藥股份有限公司
南投市南崗工業區南崗三路 272 號
TEL : (049) 2253190