



抗流行性感冒病毒·巴金森病治療劑

EZT-002
衛署藥製字第029796號
Code No.:38190

英智[®]
(阿曼他定) 錠 100公絲

Enzil[®]
(Amantadine) Tablets 100mg

3.98cm

巴金森氏症所造成的運動機能協調喪失及心理障礙失衡，對病人來說是相當不便及惱人的事。

永信的英智錠係利用其主成分Amantadine Hydrochloride治療巴金森氏症的效果，相信能提供令人滿意的療效。

【成分】每錠中含：

Amantadine Hydrochloride.....100mg

【特徵】

1. 本藥能夠促進黑質細胞活化再生，恢復合成Dopamine的能力，激發末梢突內之濾泡Vesicles所含Dopamine大量排放及增加突隙溝Synaptic cleft之Dopamine濃度，可有效的用於治療及改善巴金森氏病症。
2. 本藥經口服後迅速由胃腸道吸收，最高血中濃度在服藥後1~4小時達到，主要由尿中排泄，亦有自乳汁中分泌。
3. 本藥用於治療巴金森氏症雖不是第一線藥，但如與Anticholinergic或Levodopa等藥物併用，會增加其效果，是一種相當有用的輔助劑。

【適應症】

巴金森病、預防及治療A型流行性感冒症狀。

【用法·用量】

巴金森病：開始以100mg一天一次，5~7天後，增至100mg一天2次。

A型流行性感冒：通常成人每次100mg，一天2次，治療服用5~7天，預防服用7~10天。

小孩子：1~9歲4mg~8mg/kg/day，分次服用，最高日劑量為150mg；9~12歲同成人用量。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

(一) 慎重投與

1. 癲癇發作暨往歷之患者，痙攣發作傾向之患者（服用本藥會誘發其發作或惡化其症狀）。
2. 鬱血性心疾患之患者。
3. 末梢性浮腫之患者。
4. 腎疾患之患者。
5. 呈現低血壓之患者。
6. Parkinson's disease之患者使用向神經藥治療之患者（再加服本藥會有幻覺之現象發生）。
7. 高齡者（容易出現副作用）。

(二) 副作用

1. 精神·神經系：偶而可能出現睡眠障礙、幻覺、妄想、不安、興奮、頭昏、頭痛、頭重、神經過敏、欲動高進、集中力障害、言語障害、痙攣、抑鬱等症狀。
2. 消化器：可能出現便秘、食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛等症狀。
3. 自律神經系：可能出現口渴、起立性低血壓、心悸高進、視調節障礙、排尿障礙等症狀。
4. 過敏症：可能出現發疹等過敏症狀，遇有過敏症狀時宜中止投與。
5. 其他：可能出現下肢浮腫、網狀皮斑、無力感、倦怠感等症狀。

(三) 孕婦之投與

以rat 50mg/kg做胎仔試驗，結果有致畸胎性之報告，所以孕婦及可能懷孕之婦女勿投與。

(四) 相互作用

與其他抗Parkinson's disease類製劑如(Anticholinergic agents, Levodopa)中樞神經興奮劑如(Methamphetamine)等，併用會增強幻覺、睡眠障礙等副作用。與這些藥物併用時要小心觀察、慎重投與。

(五) 其他

1. 頭昏、搖晃不穩、眩暈等現象可能出現，因此服用本藥宜避免開車、操作機械及爬高等危險工作。
2. 本藥若要停藥，宜徐徐減量（急速停藥，會使症狀更加惡化）。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫（15~30℃）、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

4~1000錠瓶裝、盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2145553