

偏頭痛治療劑
“強生”易克痛膜衣錠
ERGOTON F.C. TABLETS "JOHNSON"
內衛藥製字第000140號

【成分】每錠含有：Ergotamine Tartrate.....1mg
Caffeine.....100mg

【賦形劑】Hydroxypropyl Methylcellulose、Magnesium Stearate、Povidone、Starch、Sunst
Yellow FCF Aluminum Lake、Talc、Tartrazine Aluminum Lake、Titanium Dioxide

【作用】1. 藥理作用：①Ergotamine Tartrate對於偏頭痛發作時頭蓋血管之擴張及緊張之喪失具有血管緊張作用而解除頭痛，Caffeine可促進Ergotamine Tartrate在腸管之吸收，同時可加強Ergotamine之頭痛緩解作用。②發現發作之前驅症狀時即刻服用本劑可獲優良的治療效果。
2. 一般藥理：Ergotamine Tartrate之主要作用係具有末梢血管收縮作用使血壓上昇，並直接作用於子宮平滑肌使其收縮而增強緊張度，Caffeine單劑係作用於中樞神經而具有精神賦活作用以及機能促進及利尿等作用，但在本劑中則幾乎不顯現出此等作用。

【適應症】血管性頭痛，如偏頭痛、組織胺性頭痛。

【用法·用量】通常成人1次2錠，以後每隔半小時服用1錠，但服用總量一日最多不可超過6錠。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】1. 禁忌：①末梢血管障礙、閉塞性血管障礙、狹心症、冠動脈硬化症及嚴重高血壓患者。②肝臟及腎機能障礙患者。③敗血症患者。④線內障患者。⑤孕婦及可能懷孕之婦女。⑥授乳婦。⑦對本劑或麥角Alkaloid(Ergotamine等)有過敏性之既往病歷患者。
2. 慎重投與：心臟機能障礙患者。
3. 副作用：①過敏症：局部性浮腫、搔癢感，偶有發疹現象發生，如有發生應即停止使用。②循環器：心悸亢進、徐脈、Cyanosis、胸部不快感等。③精神神經系：不眠、不安、振顫、偶有眩暈等症狀發生。④運動器：知覺異常(四肢麻木)、四肢肌痛、四肢脫力感等症狀，若有四肢末端刺痛感時，應即停用。⑤消化器：噁心、嘔吐、下痢等症狀。⑥長期投與：長期投與會引起血管過度收縮及動脈內膜炎，應小心觀察，慎重投與，又長期投與後立即停藥時偶有頭痛禁斷症狀發生。
⑦其他：瞳孔縮小或放大。
4. 妊婦、授乳婦之投與：①因Ergotamine Tartrate具有子宮收縮作用，故孕婦或可能懷孕之婦女切勿使用。②因Ergotamine Tartrate會在人體母乳中移行，故授乳中之婦女切勿使用。
5. 相互作用：與Propranolol或Triacetyloleandomycin併用時會增強末梢血管收縮作用，此種藥劑使用中之患者應慎重投與。
6. 適用上之注意：原則上成人1日之最大服用量為6錠，1星期之最大服用量不可超過10錠。

【儲存】本藥應儲存於25℃以下緊密容器。

【包裝】12-1,000錠 塑膠瓶裝。



Code No.:J-04

強生化學製藥廠股份有限公司
JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號
訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579
工廠電話：(02)22878405