

# 醫肺必妥 膜衣錠400毫克

## E-BUTOL F.C. Tablets 400mg

- 【成分】 Each Tablet contains : Ethambutol HCl 400mg
- 【賦形劑】 Lactose, Sodium Starch Glycolate, Carboxymethylcellulose Calcium, Povidone K-30, Magnesium Stearate, W01280
- 【適應症】 結核病。
- 【用法用量】 初期治療時依15mg/kg劑量作為每天單一劑量，再治療依25mg/kg治療60天，再改為15mg/kg，此藥應併用其他的抗結核藥，效果更佳。本藥須由醫師處方使用。
- 【作用】 本劑含主成分Ethambutol，其化學構造式為(+)-2',2'-(ethylenediimino)di-1-butanol, 2HCl為一種抗結核製劑，對於抗Mycobacterium tuberculosis和M. bovis的最小抑制濃度(MIC)為每ml 0.5~8µg，根據報告，本藥和其他的抗結核藥沒有交叉耐性，有良好的治療效果。

- 【副作用】
- 1.長期使用，會引起視覺的障害，請依醫師指示使用。
  - 2.食慾不振、嘔吐、胃部不快感、胃痛等症狀發生。
- 【注意事項】
- 1.視毒性：  
Ethambutol 可能會引起一種特殊且通常具可逆性之視力與辨色力障礙，該障礙可能是因視神經炎所致，與使用本藥之劑量及治療時間相關，因此應注意病人在服藥期間之視力與辨色力。建議在病人開始治療前先進行視力檢查，治療期間宜每個月詢問病人是否有視力與辨色力障礙。當使用劑量超過15mg/kg時，應每個月作視力檢查。
  - 2.投與本劑有時視力障害出現，投與期間要作視力檢查。
  - 3.下列患者，投與本劑時應行慎重：
    - a.視神經炎的患者。
    - b.糖尿病患者及Ethanol中毒患者。
    - c.乳幼兒投與時容易引起視力障害。
  - 4.腎障害患者，易引起蓄積作用，要慎重投藥。
  - 5.不良反應：
    - a.末梢神經系，如視神經及知覺神經等，如患者出現視覺障害及下肢麻痺感，應即停藥。
    - b.中樞神經系，有些患者有不安、不眠及幻覺現象出現。
    - c.過敏症：發熱、發疹等現象時要停藥。
    - d.消化器：有食慾不振、嘔吐、胃部不快感、胃痛等。
    - e.肝臟：有過性之S-GOT, S-GPT值的上升。
  - 6.肝膽疾患：服用包括ethambutol等多種藥品病患中曾有發生肝炎、黃疸、肝功能異常及非常罕見的肝衰竭等不良反應之案例。病人若出現肝失償之徵兆與症狀或於治療中出現不適，應進一步檢測肝功能。

- 【儲存】 25°C以下避光儲存。錠劑應儲存在未開封之原始包裝中，並置於乾燥處保存。
- 【包裝】 4-1000粒ALU-ALU鋁箔盒裝

委託者：培力國際醫藥股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路13號1樓  
電話：04-23581516(代表號)

製造廠：培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號  
電話：04-23592576(代表號)