



衛署藥製字第051022號 G-10732

富鐵隆 複方膠囊 Ferich forte capsules

【主 成 分】每膠囊含

Polysaccharide Iron Complex 326毫克(相當於Iron 150毫克)

Folic acid 1毫克

Cyanocobalamin (Vit B12) 0.025毫克

【賦 形 劑】

Copovidone、diethyl sebacate、dl- α -tocopheryl acetate、glyceryl monostearate、pharmasolve、polyethylene glycol、polyoxyl 40 hydrogenated castor oil、poloxamer、propylene glycol、sodium bicarbonate、soybean oil、sugar spheres.

Hard gelatin capsule：

F.C. red No.6, FD&C blue No.1, FD&C red No.3, FD&C yellow No.6, gelatin, glycerin, sodium lauryl sulfate, titanium dioxide.

【性 狀】

◎富鐵隆是一個鐵元素與低分子多醣類所形成的高水溶性複合物。每顆富鐵隆含有150毫克的鐵元素，膠囊內為顆粒狀的低分子多醣類鐵複合物。

◎本藥是一個容易被人體吸收利用的治療缺鐵性貧血的藥物，因為本藥是一個低分子多醣類鍵的含鐵複合物，也不會像一般鐵劑引起胃腸不舒服。

◎本藥不會汙染牙齒亦沒有金屬的味道。

【臨床藥理】

◎鐵質—

1. 紅血球製造時需要適量的鐵份。另外部分酵素也需要鐵質扮演Cofactor作用，如：Cytochromes內之電子傳遞。

2. 在臨床報告中，本劑與硫酸亞鐵對比，可產生造血反應及增加紅血素與血球容積(hematocrit)。

◎葉酸—

核蛋白合成及正常紅血球維持之必需元素。葉酸在肝臟及淋巴液，藉dihydrofolate reductase轉化成代謝活性物tetrahydrofolic acid。

◎維他命B₁₂—

維持正常紅血球、核蛋白、髓磷脂合成及細胞製造正常生長之必要元素。

【適 應 症】鐵、葉酸、維他命B₁₂缺乏症。

【用法與用量】每天一次，一次1粒。

※本藥須由醫師處方使用

【禁 忌】已知對本劑成分過敏者，有血色沉著病、血鐵質沉著症者。

【副 作 用】

◎鐵份治療所引起之副作用：便秘、下瀉、噁心、嘔吐、黑糞、胃痛。通常這些徵狀是短暫性。

◎葉酸口服或注射後曾有過敏反應之報告。

◎臨床上急性鐵份過量時，可能引起胃痛、反胃、嘔吐、下瀉、黑糞便、低血壓、心悸過速、昏睡、臉色蒼白、疲倦、抽筋甚至昏迷。本劑在老鼠口服LD₅₀應大於5000mg Iron/kg，慢性研究，在老鼠及狗，每天劑量250mg Iron/kg連續3個月尚無副作用報告。

【注意事項】

◎一般服用本藥前，應知道貧血之種類及引起原因。優先改善引起貧血之原因。劑量每日0.1mg的葉酸，在隱蔽惡性貧血的症狀，可能會造成加速性神經損害。

◎本藥請置於小孩伸手不及處。意外的鐵份過量是造成6歲以下小孩中毒致死之主要原因。

◎維他命B₁₂缺乏時單獨用葉酸不適合於治療貧血及巨胚性紅血球症。

【醫療提示】告知病患服用本藥會造成黑或棕色糞便。

【儲存方式】室溫（25℃以下），避光儲藏。

【包 裝】2~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

委託者：登碩生技醫藥股份有限公司
地 址：臺北市南京東路二段206號8樓之3

製造商：衛達化學製藥股份有限公司
地 址：台中市工業區23路21號