

"元宙" 鐵達血 膠囊  
Ferrin Capsules "Y.C."

衛部藥製字第058113號  
GMP G-12126

【成份】Each capsule contains:

Iron (Polysaccharide Complex)..... 150 mg  
Folic Acid..... 1 mg  
Cyanocobalamin..... 0.025 mg

【性狀】Iron (Polysaccharide Complex)是一個鐵元素與低分子多醣類所形成的一個高水溶性複合物。

每顆鐵達血含有150毫克的鐵元素，膠囊內的鐵元素為顆粒狀的低分子多醣類鐵複合物，用以治療缺鐵性貧血。

【臨床藥理】\*鐵質：

- 1.紅血球製造時需要適量的鐵份。另外部份酵素也需要鐵質扮演cofactor作用。  
如：*Cytochromes*內之電子傳遞。
- 2.在臨床報告中，本劑與硫酸亞鐵對比，可產生造血反應及增加紅血素與血球容積比(hematocrit)。

\*葉酸：

核蛋白合成及正常紅血球維持之必須元素。葉酸在肝臟及淋巴液，藉*dihydrofolate reductase*轉化成代謝活性物*tetrahydrofolic acid*。

\*維他命B12：

維持正常紅血球、核蛋白、髓磷脂合成及細胞製造正常生長之必要元素。

【適應症】鐵、葉酸、維生素B12缺乏症。

【用法用量】每天一次，一次1粒。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】已知對本劑成分過敏者，有血色沉著病、血鐵質沉著症者。

【副作用】\*鐵份治療所引起之副作用：便秘、下瀉、噁心、嘔吐、黑糞、胃痛。通常這些徵狀是短暫性。

\*葉酸口服或注射後曾有過敏反應之報告。

\*臨床上急性鐵份過量時，可能引起胃痛、反胃、嘔吐、下瀉、黑糞便、低血壓、心搏過速、昏睡、臉色蒼白、疲倦、抽筋甚至昏迷。本劑在老鼠口服LD<sub>50</sub>應大於5000 mg Iron/kg，慢性研究，在老鼠及狗，每天劑量250 mg Iron/kg連續3個月尚無副作用報告。

【注意事項】\*一般服用本藥前，應知道貧血之種類及引起原因。優先改善引起貧血之原因。劑量每日0.1 mg的葉酸，會隱蔽惡性貧血的症狀，可能會造成加速性神經損害。

\*本藥請置於小孩伸手不及處。意外的鐵份過量是造成6歲以下小孩中毒致死之主要原因。

\*維他命B12缺乏時，單獨用葉酸不適合於治療貧血及巨胚性紅血球症。

【警語】若患者有罕見的遺傳性半乳糖耐受性缺乏症、Lapp乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良，則不應服用本藥。

【醫療提示】告知病患服用本藥會造成黑或棕色糞便。

【儲存方式】於25°C以下，避光貯藏。

【包裝】2~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。



元宙化學製藥股份有限公司  
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路272號  
T E L : (049) 2253190