

# “強生”服緒安膜衣錠 3毫克

## FLUPEN F.C. TABLETS 3mg “JOHNSON”

### (Flupentixol)

衛部藥製字第 058174 號(GMP G-12188)

【成分】Each F.C. Tablet contains:  
Flupentixol Dihydrochloride.....3.5041mg  
(eq. to flupentixol.....3.0mg)

【臨床藥理】Flupentixol 為 Thioxanthene 類之強效、無鎮靜作用之抗精神病藥，能迅速改善精神病症狀，也能改善焦慮，使精神較活潑。後項療效是本藥適合於退縮、情緒淡漠、缺少精力或合併憂鬱症狀的病人，或容易因具強鎮靜作用而顯得疲倦或思睡的病人。

成人：劑量應視病人各別之情況而作調整，一般來說，開始時應投與低劑量，然後根據治療反應而增加劑量。

【適應症】精神病狀態。

【用法·用量】本藥須由醫師處方使用。

1. 精神分裂症及類似精神病：

每天 3-15mg，分 2 至 3 次給藥，需要時可提高到每天 30mg。

2. 妄想症：

初劑量每天二次，每次 0.5mg，然後繼續增加劑量至每天 2-3 次，每次 1mg。維持劑量：每天 1-1.5mg。

3. 智能不足及癲癇合併精神病：

初劑量每天 1-2mg，然後依病人之反應酌量增減，每日最高劑量為 4mg。

【注意事項】1. 痙攣疾病、嚴重肝腎及心血管疾病應審慎投予。

2. 本藥可能影響駕駛及操作機器。

3. 極度激動病人，急性巴比妥酸鹽、酒精和鴉片中毒的病人應禁用，孕婦禁止使用本藥。

4. 過量時，針對所出現之症狀做必要的治療。維持呼吸暢通及血壓正常，但不可用 Epinephrine。

【交互作用】1. Flupentixol 會加強酒精、巴比妥鹽及其他中樞神經抑制劑之作用。

Flupentixol 與 Phenobarbital 及 Carbamazepine 併用時之血中濃度會降低。

2. 與鋰鹽併用會加強神經毒性。

【副作用】1. 中樞神經系統：錐體外症狀可能於治療初期產生，可藉降低劑量及抗巴金森氏症藥物的投與來改善，其他偶有失眠、無力、過動、激動等現象。

2. 自主神經系統：口乾、視力模糊、便秘、唾液增加。

3. 內分泌系統和代謝：體重改變、女樣化男乳、陽萎、月經週期改變、乳漏。

4. 過敏中毒：高膽紅素血症、黃疸、全身性紅斑狼瘡、溶血性尿毒症。

5. 皮膚：紅斑、紅疹、禿髮。

【儲存】本藥應儲存於 25°C 以下緊密容器，置於兒童不及之處。

【包裝】2~1,000 錠 塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。



Code No. : G-53

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市 241 三重區三和路四段 77、79 號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405