

“南光” 復腦通 膠囊5毫克

Flunazon Capsules 5mg "N.K."

【成分名】 Flunarizine

【劑型、含量】 膠囊劑：每膠囊含Flunarizine 5mg。

【賦形劑】 Talc、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate。

膠囊殼：Pharmaceutical Gelatin、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Tartrazine、Titanium Dioxide

【臨床藥理】

Flunarizine為一選擇性的鈣離子阻斷劑，能防止細胞內鈣離子之過份負荷，但不影響心臟及血管平滑肌細胞之正常鈣離子通路。Flunarizine從消化道吸收良好，大部份由肝臟代謝，其代謝物經由膽汁從糞便中排泄。

【適應症】

噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

【用法用量】 本藥須由醫師處方使用。

偏頭痛之預防：

開始劑量---

65歲以下之患者每天睡前10mg，65歲以上之患者則每天 5mg，治療期間若發生抑鬱、錐體外症狀或其他副作用產生時，需停止用藥，若經過兩個月的治療，無改善或對藥物無反應則需停止用藥。

維持療法---

若患者對藥物反應良好且需要維持治療，可每星期連續服藥5天，休息兩天之維持療法。若維持治療效果相當良好，且耐受性佳，六個月後可停止用藥，而當患者復發時，再重新開始。

眩暈：

其開始劑量與偏頭痛類似，治療期間至症狀控制為止，一般不會超過兩個月。若慢性眩暈治療一個月或發作性眩暈治療兩個月後，仍無改善或對藥物無反應，則需要停止用藥。

【注意事項】

- 1.很少患者會於本藥治療期間發生疲倦且逐漸嚴重的現象，若此情形發生，須停止用藥。
- 2.不可超過建議服用劑量，長期維持劑量之患者，須定期回診檢視，以便即早發現錐體外症狀及抑鬱等症狀而停止用藥。而若發現治療效果逐漸不明顯，亦須停藥。
- 3.於人類懷孕期間使用本藥之安全性報告尚未建立。於動物研究顯示，本藥對懷孕各過程或現象（包括對胚胎或胎兒，受孕之過程，產前或產後發育）不產生直接或間接之副作用。
- 4.本藥可從狗乳汁中分泌出，且Flunarizine於乳汁中之濃度高於血漿，目前尚無Flunarizine於人體乳汁中分泌之數據，但仍不建議授乳期之婦女使用本藥。

5.過量：

基於Flunarizine藥理學上之特性，在過量下嗜睡及無力感應當會出現，很少有急性過量的現象被報告，曾有一次服用600mg，其症狀為嗜睡，紊亂及心悸。Flunarizine沒有特殊之解毒劑，其處理方式為輔助療法，包括服用活性炭、洗胃或嘔吐。

6.開車或操作機械：

由於會產生嗜睡現象，特別是在治療之初，所以需要駕車或操作危險機械的患者服用本劑時應小心。

7.禁忌：

有抑鬱病史之患者，或目前有帕金森氏症之患者，及其他錐體束外異常之患者。

【相互作用】

當本藥與酒精、安眠藥，或鎮靜劑合用時會產生過度鎮靜現象。本藥不與Beta-blocker產生配合禁忌。

【副作用】

最常見的副作用為嗜睡或疲倦，但都是暫時性的，以及體重增加或食慾增加。

下列為於慢性治療期間可能發生較嚴重之副作用：

抑鬱—尤其是有抑鬱病史之女性患者，其危險性更高。

錐體束外的症狀—如運動遲鈍、靜坐不能，口部及顏面運動困難、震顫，年紀較大者危險性較高。

較少發生之副作用有：

消化系統—胸口灼熱、噁心、胃痛。

中樞神經系統—失眠、焦慮。

其他—口乾、肌肉痛、皮膚發紅。

【儲藏】15°C~30°C，避光儲存。

【包裝】4-1000粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

衛署藥製字第026233號



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號

TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845