

伏順 膜衣錠 200 公絲

**Foxate** F.C.Tablets 200 mg

**[ 說明 ]**

本品可以對泌尿生殖道上的平滑肌發揮一種顯著的鎮痙功能。能對多種泌尿科的和婦科的疾病治療，特別是對抗復發的病例。

因排尿困難、急迫、夜尿及恥骨上的疼痛，或因膀胱及前列腺的疾病而引起的經常性的疼痛。例如：膀胱炎、膀胱痛、前列腺炎、尿道炎、尿道膀胱炎、尿道三角炎。

因腎及尿道的結石所做的尿道內鏡檢查，膀胱鏡導管插入式的手術，本品可做為一種抗痙攣治療的佐藥。治療下尿道手術的後遺症。

治療女性生殖道的痙攣，例如：骨盆疼痛、月經疼痛、子宮高壓及動時感痛。

**[ 成分 ]** 每錠中含有

Flavoxate Hydrochloride.....200 mg

**[ 適應症 ]**

神經性頻尿、慢性前列腺炎、慢性膀胱炎之頻尿、殘尿感。

**[ 用法·用量 ]**

一般劑量為每次一錠，每天三~四次。

本藥須由醫師處方使用。

**[ 禁忌 ]**

有下列病例者勿使用本藥：

- (1) 對本品敏感者。
- (2) 有幽門及十二指腸的阻塞、腸阻塞等疾病之患者。
- (3) 有胃腸出血者。
- (4) 下尿道泌尿器阻塞疾病之患者。

**[ 警告 ]**

1. 帶有泌尿生殖道的併發感染的病患，本品應該和抗感染的治療，以適當之需要量配藥。
2. 青光眼，尤其是帶有 Closed-angle 的病患，應小心地服用本劑。
3. 操作機械及從事於須全神貫注的工作時，須特別注意，本藥可能引起的昏睡及視力模糊。

**[ 孕婦的使用 ]**

動物試驗顯示，本品對孕婦及胎兒無害。然而，在懷孕期間，假如要和其他藥品一起服用必須要小心，尤其在懷孕的前三個月。

**[ 兒童 ]**

由於 12 歲以下兒童的安全性及效能尚未被證實，因此 12 歲以下的兒童，不應該服用此藥。

**[ 副作用 ]**

服用本品偶而會有噁心及嘔吐的現象(飽胃之後，此現象消失)；會有昏昏欲睡的感覺(減低用量或減低服藥的次數，現象消失)；會有口乾、視力模糊、眼睛張力增加、心跳加速或心悸等現象。高劑量會造成便秘。

**[ 貯存條件 ]**

請置於緊密、避光的容器中，貯存於 30℃ 以下。

**[ 包裝 ]**

6 ~ 1000 錠，塑膠瓶、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-7582 號  
044572

**SYNMOSA**

**健喬信元醫藥生技股份有限公司**

30030 新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號