



鎮痛・鎮痙劑

FCT-004
衛署藥製字第04506號

保賜康 Fucon

錠

Tablets



2.9cm

胃、十二指腸潰瘍常有併發副交感神經（迷走神經）機能亢進之症狀發生，因此，從抑制副交感神經有作用之物質如Atropine, Scopolamine等之Alkaloid而合成之數種第四級Ammonium化合物，其中之一的Hyoscine-N-Butyl bromide被證實為副作用最少，對副交感神經節之神經傳導具有特異之遮斷作用，對胃腸管、膽管、尿路等之鎮痙作用，有顯著的效果。

【成 分】每錠中含：

Hyoscine-N-Butylbromide.....10mg

【賦形劑】

Lactose、Microcrystalline Cellulose、Aluminum Silicate (SYN.)、Carmellose Calcium、Magnesium Stearate、Talc。

【適應症】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、十二指腸炎，賁門痙攣、食道痙攣、痙攣性便秘、膽管之痙攣及運動障害、尿路之痙攣、分娩時子宮下部弛緩之遲延、切迫流產、不全流產之治療補助。

【用法・用量】

通常成人1次1~2錠，1日3~5次以少量開水吞服之。
本藥須由醫師處方使用。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

6~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。




永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2140861

