

"正和" 暢循 持續性膜衣錠400毫克 (配妥西菲林)

FYLIN Retard F.C. Tablets 400mg "C.H." (Pentoxifylline)

【成分名】Pentoxifylline

【劑型、含量】

持續性膜衣錠:每錠含Pentoxifylline.....400mg

【臨床藥理】

Pentoxifylline可促進末梢血液循環,作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。吸收後很快經肝臟代謝(First-pass effect)成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。

【適應症】

末梢血管循環障礙。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

- 1.通常成人劑量,一天3次,每次100~400mg,伴著些液體整粒吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時,則其劑量應減量,如果其副作用仍然持續,則停止服用。
- 2.雖然在治療2~4週後,即會出現療效,但仍須持續治療八週以上。
- 3.有低血壓,血壓不穩的患者或腎功能不良者,須調整個別劑量。

【注意事項】

- 1.腎功能不全之患者,Pentoxifylline廓清率降低,可能引起毒性,需減少劑量。
- 2.對Pentoxifylline有敏感性的病人不可服用此劑。
- 3.有視網膜出血或急性心肌梗塞及懷孕中的婦女不可服用本劑。
- 4.Pentoxifylline和其它代謝物會排泄於乳汁中。老鼠實驗中有引起腫瘤的可能,應依此藥對母親之重要性審慎評估。
FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數): C
- 5.18歲以下兒童安全性尚未建立。
- 6.禁忌:對Pentoxifylline或Methylxanthines(如Caffeine、Theophylline、Theobromine)過敏者禁用。

【相互作用】

Pentoxifylline會延長Prothrombin time,增加出血機會,因此使用Warfarin的病人要時常監測PT。有出血傾向者要定期檢驗血液實驗值(包括血紅素、血比容)。

【副作用】

- 1.一般症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈(碰到這些症狀,須作適量的劑量調整)。
- 2.皮膚潮紅、心跳加快,胸氣塞或低血壓(這些副作用可能是因為高劑量的服用,須將劑量減低,作適量調節)。
- 3.少數副作用例子有搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫(這些副作用作適量的劑量調節即可)。
- 4.本藥中毒之症狀與劑量有關,通常出現於服用4~5小時後並持續12小時。症狀有潮紅、低血壓、緊張、興奮、顫抖、痙攣、嗜睡、意識喪失、發燒和激動。
治療:洗胃並使用活性碳。監測心電圖與血壓。除了症狀治療外,維持呼吸與血壓,治療心律不整並控制痙攣。

【儲存條件】請儲存於25°C以下避光容器中

【包裝】6~1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

【賦形劑】Lactose Monohydrate、PVP、HPMC、Silicon Dioxide、PEG、Magnesium Stearate、Titanium Dioxide、Erythrosine Aluminum Lake

衛署藥製字第041488號

正和製藥股份有限公司新營廠
台南市新營區新工路23號(新營工業區)