

【說明書】

嘉嘉雙層錠
Gelgel Double Layer Tablets

許可證字號：衛署藥製字第 027005 號

【成分】每錠中含有：

有效成分及含量：Dried Aluminum Hydroxide Gel 200 毫克、Magnesium Hydroxide 200 毫克、Simethicone 25 毫克。

其他成分(賦形劑)：Sucrose、Sodium Saccharin、Potato Starch、Strawberry Powder、Menthol、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate、Tartrazine、Cyclamate Sodium、Microcrystalline Cellulose 101、Lactose、Water Purified。

單次劑量(2 錠)之酸中和能力為 18 mEq，鎂含量為 13.7 mEq。

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

※曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)3 歲以下。

(二)消化道潰瘍的人。

(三)有腎臟疾病的人。

(四)須限鹽飲食的人。

(五)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

- (三)勿超過建議使用量。
- (四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (五)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】

年齡	使用量
成人及 12 歲以上	一天 3 次或需要時服用，每次 2 錠。
6 歲以上未滿 12 歲	一天 3 次或需要時服用，每次 1 錠。
3 歲以上未滿 6 歲	一天 3 次或需要時服用，每次 1/2 錠。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐。

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】12 ~ 1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲藏條件】請貯存於 25℃ 以下之陰涼處，且於期限內使用。

LT-T116

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號